Pendi

Herbicide

Herbicide pour les grandes cultures, les cultures maraîchères et les plantes ornementales.

Produit	Pendi est un SC suspension concentrée et contient 36.04% (400 g/l) Pendimethalin.
Cultures	pois écossés, carotte, fenouil bulbeux, poireau (semé / planté), scorsonère, oignon, céleri-pomme, choux, céleri-branche, Roseau de Chine, pois protéagineux, Orge, Seigle, Épeautre, Triticale, Blé, Pommes de terre, Kenaf, Lupin, Maïs, Tournesol, Riz semis sur terrain sec, Prairies et pâturages, cultures florales et plantes vertes.
Spectre d'efficacité	Agrostides jouet du vent, vulpins, digitaires, panics pied-de-coq, pâturins, sétaires, arroches, chénopodes, capselles, euphorbes, fumeterres, orties royales, lamiers, mercuriales, myosotis, coquelicots, renouées, moutardes, mourons des oiseaux, thlaspis, orties brûlantes, véroniques; ravenelles, camomilles(seulement en pré-émergence), gaillets, pensée des champs. Pas d'efficacité contre les vivaces.
Emploi **Culture maraîchère**	**Carotte:** 2.5 - 4 lt/ha contre *dicotylédones annuelles et monocotylédones annuelles*. Application: pré-levée. **Céleri-pomme, Choux, Poireau (planté), Céleri- branche:** 4-5 lt/ha contre *dicotylédones annuelles et monocotylédones annuelles*. Application: avant la plantation. **Fenouil bulbeux, Oignon, Poireau (semé) Scorsonère:** 2 - 4 lt/ha contre *dicotylédones annuelles et monocotylédones annuelles*. Application: pré-levée. **Pois écossés:** 1 lt/ha contre *dicotylédones annuelles et monocotylédones annuelles*. Uniquement en mélange avec 2 lt/ha Effican.
Grande culture	**Blé d'automne, Épeautre, Orge d'automne, Seigle d'automne, Triticale:** 3-4 lt/ha contre *dicotylédones annuelles et monocotylédones annuelles*. Application: pré-levée. Ne pas utiliser sur des sols sablonneux. Cette autorisation n'inclut pas les céréales semées après un travail superficiel. Le traitement est autorisé uniquement sur les semis dont la profondeur est régulière (3-4cm).

	Kenaf: 4-5 lt/ha contre *dicotylédones annuelles et monocotylédones annuelles*. Application: pré-levée. **Lupin:** 2.5-4 lt/ha contre *dicotylédones annuelles et monocotylédones annuelles*. Application: pré-levée. **Maïs:** 3-5 lt/ha contre *dicotylédones annuelles et monocotylédones annuelles*. Application: pré-levée. **Pois protéagineux:** 1 lt/ha contre *dicotylédones annuelles et monocotylédones annuelles*. Application: post-levée. Uniquement en mélange avec 2 lt/ha Effican. **Pommes de terre:** 4-5 lt/ha contre *dicotylédones annuelles et Monocotylédones annuelles*. Application: pré-levée. **Prairies et pâturages:** 4 lt/ha contre *véronique filiforme*. Application: automne, après la dernière coupe. **Riz semis sur terrain sec:** 4-5 lt/ha contre *dicotylédones annuelles et monocotylédones annuelles*. Application: pré-levée. **Roseau de Chine:** 4 lt/ha contre *dicotylédones annuelles et monocotylédones annuelles*. Application: pré-levée. **Tournesol:** Dosage: 3-4 lt/ha contre *dicotylédones annuelles et monocotylédones annuelles*. Application: immédiatement après le semis.
Culture ornementale	**Cultures florales et Plantes vertes:** 2.5-4 lt/ha contre *dicotylédones annuelles et monocotylédones annuelles*. Application: avant le repiquage ou la plantation ou au printemps avant le débourrement. Tolérance des cultures: selon avis L+G. ***Instructions générales:*** ne pas utiliser sur des sols sablonneux. **Remarques :** Utiliser la haute dose dans les sols lourds ou humifères. Dans les cultures semées, un léger jaunissement est possible après des fortes précipitations juste après le traitement.
Mode d'action	La matière active Pendimethalin est absorbé par les feuilles, les racines et les coléoptiles. Dans les plantes sensibles, Pendimethalin empêche la division et l'allongement des cellules.
Préparation de la bouillie	Verser la quantité mesurée de Pendi directement dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. **Remarques :** Utiliser la haute dose dans les sols lourds ou humifères. Dans les cultures semées, un léger jaunissement est possible après des fortes précipitations juste après le traitement.
Rotation des cultures	Après un labour prématuré on peut planter des céréales, maïs, pommes de terre, féveroles, pois, trèfle rouge, luzerne, soja ou tournesol.

Fiche technique

Classement	Attention  Tenir hors de portée des enfants. EUH 208 Contient (Pendimethaline, 1,2-Benzisothiazolin-3-one). Peut produire une réaction allergique. EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Le produit est homologué par l'OFAG. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	5 lt, 10 lt.
A Observer	Cette fiche est pour information et ne remplace pas l'étiquette. Avant l'utilisation d'un produit, toujours lire l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 10.01.18/RH/LG1125

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch