
Prestop®

Biologisches Fungizid für den Beeren,- Gemüse-, Wein- und Zierpflanzenbau



In nur wenigen Stunden nach dem Sprühen ist der Pilz physikalisch fixiert. An der Pflanze beginnt der Keimungsprozess und das Wachstum des Myzels.



Clonostachys rosea, ein natürlich vorkommender Pilz.



Clonostachys rosea ist ein saprophytischer Pilz. Er wächst auf totem Gewebe, wirkt als Schutzbarriere gegen das Eindringen von Pilzen und Krankheitserregern.

- ✓ **2-fach Wirkung**
- ✓ **Keine chemischen Rückstände**
- ✓ **sicher für den Anwender**
- ✓ **konstante Wirksamkeit**
- ✓ **Zulassung im Bioanbau**
- ✓ **Keine Gefahr der Resistenzbildung**

5413 Birmenstorf, Telefon 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax AG

Besondere Eigenschaften von Prestop®

Prestop® ist ein Mikroorganismenpräparat auf der Basis des natürlich vorkommenden Bodenpilzes Clonostachys rosea. Der Pilz überlebt nach der Anwendung mehrere Wochen in der Rhizosphäre sowie auf Blättern und Stängeln der Kulturen und schützt diese vor diversen Schadpilzen.
Pathogene Pilze werden durch Konkurrenz um Nahrung und Lebensraum verdrängt. Darüber hinaus erfolgt eine Parasitierung der Zielorganismen.
Prestop® eignet sich auf Grund der Wirkungsweise besonders für den präventiven Einsatz.
Spätestens beim Auftreten erster Krankheitssymptome sollte eine Anwendung erfolgen, welche je nach Befallsdruck und Kulturdauer mehrmals zu wiederholen ist.

Produkteprofil von Prestop®

Formulierung:	Wasserdispergierbares Pulver
Wirkstoffe:	32 % [Stamm J1446; 2 x 10 exp. 8 cfu / g] Clonostachys rosea
Verpackung:	1 kg

Lagerung

Lagerung: 12 Monate in der Originalverpackung hermetisch dicht an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur unter 5 °C oder 4 Wochen bei Zimmertemperatur. Sofort nach dem Öffnen verwenden.



Clonostachys rosea ist ein Hyperparasitenpilz. Es wächst auf Kosten von pathogenen Pilzen. Die Hyphen von Clonostachys rosea wickeln sich um den pathogenen Pilz und bauen seine Zellwände durch Sekretion von Enzymen ab.

Erdbeeren: 0.5%, gegen Graufäule *(Botrytis cinerea)* (Teilwirkung). Anwendung: Stadium 60-73 (BBCH). Maximal 2 Behandlungen pro Kultur im Abstand von mindestens 3 Wochen.

Gurken, Paprika, Tomaten (Gewächshaus): 0.5%, gegen *Graufäule* (Botrytis cinerea). Anwendung: Stadium 15-89 (BBCH). Maximal 4 Behandlungen pro Kultur im Abstand von mindestens 3 Wochen.

Gurken (Gewächshaus): 1%, gegen *Gummistengelkrankheit.* Spritzen. Behandlung im Abstand von 3 - 4 Wochen wiederholen.

Gurken, Paprika, Tomaten (Gewächshaus): 500 g/m³, *gegen Krankheiten durch pathogene Bodenpilze [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.]* (Teilwirkung). Giessen vor der Aussaat oder Pflanzung. Anzucht von Jungpflanzen und Saatbeet-Behandlung.

Küchenkräuter (Gewächshaus), Blumenkulturen und Grünpflanzen (Gewächshaus): 500 g/m³, *gegen Krankheiten durch pathogene Bodenpilze [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.].* Anzucht von Jungpflanzen und Saatbeet-Behandlung. Vor der Aussaat oder Pflanzung mit dem Substrat mischen.

Blumenkulturen und Grünpflanzen (Gewächshaus): 0.5%, *gegen Krankheiten durch pathogene Bodenpilze [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.].* Anwendung: Stadium 13-65 (BBCH). Maximal 4 Behandlungen pro Kultur im Abstand von mindestens 3 Wochen. Giessen.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.
Vor Verwendung stets Etikette und Produkteinformationen lesen.

Leu+Gygax AG
5413 Birmenstorf AG, Telefon 056 201 45 45
www.leugygax.ch / info@leugygax.ch