
Prestop®

Fongicide biologique dans les cultures maraîchères, les petits fruits, la viticulture et les plantes ornementales



En seulement quelques heures après pulvérisation, le champignon est physiquement fixé sur la plante, il débute son processus de germination et la croissance du mycélium.



Clonostachys rosea, un champignon naturel.



Clonostachys rosea est un champignon saprophyte. Il se développe sur les tissus morts, agissant comme une barrière protectrice contre les entrées de champignons pathogènes.

- ✓ **Double effet**
- ✓ **Pas de résidus chimiques**
- ✓ **Sans danger pour l'utilisateur**
- ✓ **Efficacité constante**
- ✓ **Agrément pour l'agriculture biologique**
- ✓ **Pas de danger de développer une résistance**

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax SA

Les particularités de Prestop®

Prestop® est une préparation de micro-organismes basée sur le champignon naturel du sol Clonostachys rosea. Le champignon survit dans la rhizosphère pendant plusieurs semaines après utilisation ainsi que sur les feuilles et les tiges des cultures et les protège de divers champignons nuisibles.
Les champignons pathogènes sont ainsi concurrencés pour la nourriture et leurs espaces vitaux. Ainsi il se crée une parasition des organismes ciblés. De par son mode d'action, Prestop® est particulièrement adapté à un usage préventif.
Au plus tard lorsque les premiers symptômes de la maladie apparaissent, elle doit être utilisée, doit être répété plusieurs fois après la pression d'infestation et la durée de la culture.

Le profil de Prestop®

Formulation:	Poudre dispersible dans l'eau
Maitère active:	32 % [souche J1446; 2 x 10 exp. 8 cfu / g] Clonostachys rosea
Emballage:	1 kg

Stockage

Stockage: 12 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement proche d'un endroit frais et sec Placer et à une température inférieure à 5 °C ou 4 semaines à température ambiante. Immédiatement après l'ouverture utiliser.

Prestop® avec le champignon: Clonostachys rosea

Champignon patogène Rhizoctonia solani



Clonostachys rosea est un champignon hyperparasite. Il se développe au dépend des champignons pathogènes. Les hyphes de Clonostachys rosea s'enroulent autour du champignon pathogène et dégradent ses parois cellulaires par la sécrétion d'enzymes.

Fraises: 0.5%, contre la pourriture grise du fraisier *(Botrytis cinerea)* (Effet partiel). Application: Stade 60-73 (BBCH). Max. 2 traitements par culture à intervalle de 3 semaines au moins.

Concombre, Piment, tomate (sous serre): 0.5%, contre *Botrytis* (Botrytis cinerea). Application: Stade 15-89 (BBCH). Max. 4 traitements par culture à intervalle de 3 semaines au moins.

Concombre (sous serre): 1%, contre *Gommose des cucurbitacées [Didymella bryoniae]* . Pulvériser. Répéter le traitement toutes les 3-4 semaines.

Concombre, Piment, tomate (sous serre): 500 g/m³, *contre les maladies causées par des champignons pathogènes du sol [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.]* (Effet partiel). Arroser avant de semer ou de planter. Culture de jeunes plants et traitement des lits de semences.

Herbes culinaires (sous serre), Floriculture et plantes vertes (sous serre): 500 g/m³, *contre les maladies causées par des champignons pathogènes du sol [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.].* Culture de jeunes plants et traitement des lits de semences. Mélanger avec le substrat avant de semer ou de planter.

Floriculture et plantes vertes (sous serre): 0.5%, *contre les maladies causées par des champignons pathogènes du sol [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.].* Application: Stade 13-65 (BBCH). Max. 4 traitements par culture à intervalle de 3 semaines au moins. Arroser.

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Leu+Gygax SA
5413 Birmenstorf AG, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch / info@leugygax.ch