
Prestop®

Fungicida biologico per le colture di bacche, viticoltura, orticoltura e piante ornamentali



Poche ore dopo il trattamento, il fungo viene fisicamente fissato. Sulla pianta, comincia il processo di germinazione e la crescita del micelio.



Clonostachys rosea, un fungo presente in natura.

Clonostachys rosea è un fungo saprofita. Esso cresce su tessuto morto e agisce come barriera di protezione contro la penetrazione di funghi e agenti patogeni.



- ✓ **2- volte efficace**
- ✓ **Nessun residuo chimico**
- ✓ **Sicuro per chi lo usa**
- ✓ **Azione costante**
- ✓ **Ammesso in coltura biologica**
- ✓ **Nessun pericolo di resistenza**

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax SA

Particolari qualità di Prestop®

Prestop® è un preparato a base di microrganismi, i quali derivano dal fungo Clonostachys rosea, presente naturalmente nel terreno. Il fungo sopravvive, dopo il trattamento diverse settimane nella rizosfera, come pure sulle foglie e sugli steli delle colture e protegge questi da diversi agenti patogeni.
I funghi patogeni, vengono allontanati tramite la concorrenza per l'alimentazione e per il possesso dello spazio vitale.
Al di sopra, avviene un parassitismo dell'organismo preso di mira.
Prestop® si presta sulla base del modo d'azione specialmente per un trattamento preventivo.
Più tardi alla comparsa dei primi sintomi di malattia, dovrebbe venire applicato un primo trattamento, il quale a seconda dell'attacco parassitario e la durata della coltura deve essere ripetuto più volte.

Prestop® con il suo fungo: Clonostachys rosea

Fungo patogeno: Rhizoctonia solani



Clonostachys rosea è un fungo parassitario. Esso cresce a spese del fungo patogeno. Le ife di Clonostachys rosea si avvolgono al fungo patogeno e costruiscono le pareti delle loro cellule attraverso secrezioni di enzimi.

Profilo del prodotto Prestop®

Formulazione:	Polvere da disperdere nell'acqua
Materie attive:	32 % [Ceppo J1446; 2 x 10 exp. 8 cfu / g] Clonostachys rosea
Confezionamento:	1 kg

Stoccaggio

12 mesi nel pacco originale, chiuso ermeticamente in un posto fresco e asciutto con una temperatura sotto i 5 C° oppure 4 settimane a temperatura ambiente. Usare subito dopo l'apertura del pacchetto.

Fragole: 0.5%, contro muffa grigia *(Botrytis cinerea)* (efficacia parziale). Impiego: Stadio 60-73 (BBCH). Massimo 2 trattamenti per coltura a distanza minimale di 3 settimane.

Vigna: 0.167% (2 kg/ha) contro *muffa grigia.* Impiego: ultimo stadio del trattamento BBCH 67-85. Al più tardi metà agosto.

Cocomeri, peperoni, pomodori (in serra): 0.5% contro *muffa grigia* (Botrytis cinerea). Impiego: Stadio 15-89 (BBCH). Massimo 4 trattamenti per coltura a distanza minima di 3 settimane.

Cocomeri (in serra): 1%, contro *la gommosi dello stelo.* Irrorare. Ripetere il trattamento a distanza di 3-4 settimane.

Cocomeri, peperoni, pomodori (in serra): 500 g/m³, contro *malattie causate da funghi patogeni del terreno [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.]* (efficacia parziale). Annaffiare prima della semina o del trapianto. Allevamento di giovani piante e trattamento del letto di semina.

Erbe aromatiche (in serra), colture di fiori e piante verdi (in serra): 500 g/m³, contro *malattie causate da funghi patogeni [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.].* Allevamento di giovani piante e trattamento del letto di semina. Prima della semina o del trapianto mescolarlo al substrato.

Colture di fiori e piante verdi (in serra): 0.5%, contre *Imalattie causate da funghi patogeni del terreno [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.].* Impiego: Stadio 13-65 (BBCH). Massimo 4 trattamenti per coltura a distanza minima di 3 settimane. Annaffiare.

Utilizzate i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'utilizzazione leggere le etichette e le informazioni concernente il prodotto.

Leu+Gygax SA
5413 Birmenstorf AG, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch / info@leugygax.ch