Technisches Merkblatt

Prestop ®

Fungizid

Biologisches Fungizid für den vorbeugenden Einsatz gegen Erreger von Keimlings- und Wurzelkrankheiten sowie Botrytis cinerea und Didymella bryoniae im Beeren-,Wein-, Gemüse- und Zierpflanzenbau.

Produkt	Prestop ist als Wasserdispergierbares Pulver (WP) formuliert und enthält 32 % [Stamm J1446; 2 x 10 exp. 8 cfu / g] Gliocladium catenulatum.
Anwendungsbereich	Beerenbau, Gemüsebau, Weinbau, Zierpflanzen.
Wirkungsspektrum	Graufäule (Botrytis cinerea), Gummistengelkrankheit, Krankheiten durch pathogene Bodenpilze [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.]
Anwendung **Beerenbau**	**Erdbeeren:** 0.5%, gegen (Teilwirkung) *Graufäule (Botrytis cinerea)*. Anwendung: Stadium 60-73 (BBCH). Maximal 2 Behandlungen pro Kultur im Abstand von mindestens 3 Wochen.
Weinbau	**Reben:** 0.167% (2 kg/ha) gegen (Teilwirkung) *Graufäule (Botrytis cinerea)*. Anwendung: Letzte Behandlung bei Beginn des Farbumschlages, jedoch spätestens Mitte August, Stadium 67-85 (BBCH). Spritzen. Maximal 4 Behandlungen pro Jahr. Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf eine Behandlung der Traubenzonesowie eine Referenzbrühmenge von 1200l/ha (Berechnungsgrundlage).
Gemüsebau	**Gurken, Paprika, Tomaten (Gewächshaus):** 0.5%, gegen *Graufäule (Botrytis cinerea)*. Anwendung: Stadium 15-89 (BBCH). Maximal 4 Behandlungen pro Kultur im Abstand von mindestens 3 Wochen. **Gurken (Gewächshaus):** 1%, gegen *Gummistengelkrankheit*. Spritzen. Behandlung im Abstand von 3 - 4 Wochen wiederholen.

Zierpflanzenbau	**Gurken, Paprika, Tomaten (Gewächshaus):** 500 g/m³, gegen (Teilwirkung) *Krankheiten durch pathogene Bodenpilze [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.]*. Giessen vor der Aussaat oder Pflanzung. Anzucht von Jungpflanzen und Saatbeet-Behandlung. **Küchenkräuter (Gewächshaus):** 500 g/m³, gegen *Krankheiten durch pathogene Bodenpilze [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.]*. Anzucht von Jungpflanzen und Saatbeet-Behandlung. Vor der Aussaat oder Pflanzung mit dem Substrat mischen. **Blumenkulturen und Grünpflanzen (Gewächshaus):** 0.5%, gegen *Krankheiten durch pathogene Bodenpilze [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.]*. Anwendung: Stadium 13-65 (BBCH). Maximal 4 Behandlungen pro Kultur im Abstand von mindestens 3 Wochen. Giessen. **Blumenkulturen und Grünpflanzen (Gewächshaus):** 500 g/m³ gegen *Krankheiten durch pathogene Bodenpilze [Fusarium spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.]*. Anzucht von Jungpflanzen und Saatbeet-Behandlung. Vor der Aussaat oder Pflanzung mit dem Substrat mischen.
Wirkungsweise	Prestop ist ein Mikroorganismenpräparat auf der Basis des natürlich vorkommenden Bodenpilzes Gliocladium catenulatum. Dieser besiedelt die Oberfläche der Wurzeln und sämtlicher oberirdischer Pflanzenteile. Pathogene Pilze werden durch Konkurrenz um Nahrung und Lebensraum verdrängt. Darüber hinaus erfolgt eine Parasitierung der Zielorganismen.
Herstellung Spritzbrühe	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die abgemessene Menge **Produkt** beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen. **Mischbarkeit:** Prestop® ist mit unseren Pflanzenschutzmittel mischbar.
Nachbau	Keine Einschränkung
Einstufung	**Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.** **Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.** **Berührung mit der Haut vermeiden.** **Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.** **EUH 401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.** **SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.**

Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW und FIBL bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten. **Produkt** ist kein Bienengift.
Verpackung	1 kg **Lagerung und Haltbarkeit** Im geschlossenen Gebinde trocken und kühl bei max. 4 °C mind. 12 Monate haltbar. Es wird empfohlen, nach der Öffnung den gesamten Packungsinhalt aufzubrauchen. Geöffnete Packungen kühl sowie gut verschlossen lagern und zügig aufbrauchen.
®	Reg. Marke der Danstar Ferment AG
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 23.12.20/RH/LG1260

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch