Scheda Tecnica

Quiz Pro

Promuove la resistenza delle piante contro le malattie.

Prodotto	Quiz contiene: 0.2% estratto di erba cavallina (estratto di Equisetum).
Colture	Campicoltura, Coltivazione di bacche, Coltivazione piante ornam., Frutticoltura, Orticoltura, Viticoltura.
Spettro di efficacia	L'erba cavallina, contiene acido silicico. Questo, rinforza le pareti delle cellule delle piante e migliora cosi la loro resistenza di fronte agli agenti patogeni.
Applicazione **Coltivazione di bacche**	**Fragola:** 0,225 lt/100 lt acqua, contro *Oidio della fragola, Botrytis, Marciume dei frutti da Colletotrichum, Marciume radicale della fragola*. Applicazione: ripetere e bagnare sempre a fondo (per bene). **Lampone:** 0,225 lt/100 lt acqua, contro *Oidio della fragola, Botrytis, Marciume dei frutti da Colletotrichum, Marciume radicale della fragola*. Applicazione: ripetere e bagnare sempre a fondo.
Frutticoltura	**Frutta a granelli:** 0,2 lt/100 lt acqua, contro *Ticchiolatura della frutta a granelli, Oidio della mela/pera*. Applicazione: ripetere il trattamento a distanza di 10-14 giorni. Annaffiare: nella zona delle radici 10 l/pianta a partire da metà agosto, 3-4 applicazioni. **Pesco/pesco noce:** 0,2 lt/100 lt acqua, contro *Ticchiolatura della frutta a granelli, Oidio della mela/pera, Bolla del pesco*. Applicazione: a partire dalla germogliazione, trattare a distanza di 10-14 giorni. Annaffiare: nella zona delle radici 10 litri/pianta a partire da metà agosto, 3-4 applicazioni.
Viticoltura	**Vite:** 0,2 lt/100 lt acqua, contro *Peronospora della vite (Plasmopara viticola), Oidio della vite (Uncinula necator)*. Applicazione: prima della fioritura 3-4 applicazioni. Dopo la fioritura 3-4 applicazioni.

Campicoltura **Orticoltura** **Coltivazione di piante ornamentali**	**Patate:** 0.225lt/100 lt acqua, contro *Peronospora della patata, Alternariosi delle solanacee*. Applicazione: trattare appena che le file cominciano a chiudersi. **Orticoltura in generale:** 0.225lt/100 lt acqua, contro *Alternariosi delle solanacee (Alternada solani), Septoriosi del pomodoro/della melanzana (Septoria lycopersici), Oidio delle Cucurbitacee (Podosphaera xanthii), Mal del piede (Pythium spp.)*. Applicazione: ogni 10-14 giorni bagnare a fondo (la poltiglia deve sgocciolare) oppure annaffiare regolarmente. **Pomodori:** 0.225lt/100 lt acqua, contro *Alternariosi delle solanacee (Alternada solani), Septoriosi del pomodoro/della melanzana (Septoria lycopersici).* Applicazione: ogni 10-14 giorni trattare a fondo (la poltiglia deve sgocciolare) oppure annaffiare regolarmente. **Cocomeri:** 0.225lt/100 lt acqua, contro *Oidio delle Cucurbitacee (Podosphaera xanthii), Mal del piede (Pythium spp.)*. Applicazione: trattare a fondo (la poltiglia deve sgocciolare). **Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Rose, Colture da fiore e piante verdi:** 0.225lt/100 lt acqua, contro *Peronospora (diverse specie) su piante ornamentali, Oidio (diverse specie) su piante ornamentali*. Applicazione: trattare ogni 10-14 giorni. Annaffiare secondo la crescita a distanze regolari.
Modalità di azione	L'estratto di erba cavallina, causa il contenuto di acido silicico aumenta la capacità delle piante a difendersi. L'acido silicico rafforza le pareti delle cellule, perciò i funghi e di conseguenza le loro spore come pure gli insetti hanno difficoltà a colpire le piante. Per questo, il trattamento a base di erba cavallina, deve essere eseguito preventivamente.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderata, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Quiz è mescolabile secondo consiglio della ditta LG.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.

Comportamento nell'ambiente	Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'UFAG e FiBL. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	5 lt.
®	
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni indicate.

Version 10.09.25/RH/RF/LG1309

Leu+Gygax AG

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch