Ranman® Top

Fungizid

Hochaktives Fungizid mit langer Dauerwirkung gegen Kraut- und Knollenfäule an Kartoffeln und gegen Falsche Mehltaupilze im Gemüsebau.

Produkt	Ranman Top ist ein Suspensionskonzentrat und enthält 14.8% (160g/lt) Cyazofamid. W-6889
Anwendungsbereich	Gemüsebau, Feldbau.
Wirkungsspektrum	Kraut- und Fruchtfäule, Kraut- und Knollenfäule, Falscher Mehltau der Kürbisgewächse, Blauschimmel des Tabaks.
Anwendung Gemüsebau	**Aubergine, Tomaten:** 0.05 %, gegen *Kraut- und Fruchtfäule*. Wartefrist: 3 Tage. Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Bei Befallsbeginn. Zur Vermeidung einer Resistenzbildung maximal 3 Behandlungen pro Kultur mit Produkten aus der Wirkstoffgruppe FRAC Nr.21 (Quinone inside Inhibitors, QiI). Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 6 m zu Oberflächengewässern einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle reduziert werden. **Gurken, Kürbisse mit geniessbarer Schale (Freiland):** 0.05 % (0.5 lt/ha), gegen *Falscher Mehltau der Kürbisgewächse*. Wartefrist: 3 Tage. Behandlung bei Befallsbeginn. Zur Vermeidung einer Resistenzbildung maximal 3 Behandlungen pro Kultur mit Produkten aus der Wirkstoffgruppe FRAC Nr.21 (Quinone inside Inhibitors, QiI). Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 6 m zu Oberflächengewässern einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle reduziert werden. Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).

Feldbau	**Kürbisgewächse, Cucurbitacea (Gewächshaus):** 0.05 % (0.5 lt/ha) gegen *Falscher Mehltau der Kürbisgewächse*. Wartefrist: 3 Tage. Behandlung bei Befallsbeginn. Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Zur Vermeidung einer Resistenzbildung maximal 3 Behandlungen pro Kultur mit Produkten aus der Wirkstoffgruppe FRAC Nr.21 (Quinone inside Inhibitors, QiI). **Kartoffeln:** 0.5 lt/ha, gegen *Kraut- und Knollenfäule*. Wartefrist: 2 Woche(n). Behandlung bei Befallsbeginn. Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Bei Frühkartoffeln 1 Woche Wartefrist. Zur Vermeidung einer Resistenzbildung maximal 3 Behandlungen pro Kultur mit Produkten aus der Wirkstoffgruppe FRAC Nr.21 (Quinone inside Inhibitors, QiI). **Tabak:** 0.5 lt/ha, gegen *Blauschimmel des Tabaks*. Zur Vermeidung einer Resistenzbildung maximal 3 Behandlungen pro Kultur mit Produkten aus der Wirkstoffgruppe FRAC Nr.21 (Quinone inside Inhibitors, QiI). Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 6 m zu Oberflächengewässern einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle reduziert werden.
Wirkungsweise	Cyazofamid ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Cyanoimidazole. Er hemmt den Elektronentransport in den Mitochondrien und blockiert somit die Atmungskette. Er verbindet sich mit der Wachsschicht des Blattes und bleibt nach einer Stunde regenfest
Herstellung Spritzbrühe	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die abgemessene Menge **Produkt** beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen. **Mischbarkeit:** Ranman Top ist mit unseren Insektiziden und Blattdüngern mischbar. Mischbrühen sind sofort zu verwenden. **Anwenderschutz:** Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzbrille oder Visier tragen.
Nachbau	Keine Einschränkung
Einstufung	Gefahr  P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

	SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLV bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	1 lt. 5 lt.
®	Reg. Marke der Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., Japan
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 11.03.25/RH/LG0960

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45

www.leugygax.ch