Fiche technique

Ranman® Top

Fongicide

Fongicide hautement actif avec une longue durée d'action pour la lutte contre le mildiou des pommes de terre et contre les mildious des cultures maraîchères.

Produit	Ranman® Top est une suspension concentrée (SC)e t contient 14.8 % (160 g/l) cyazofamide. W-6889
Cultures	grandes cultures (F), cultures maraîchères (G).
Spectre d'efficacité	mildiou de la tomate, mildiou des cucurbitacées, mildiou de la pomme de terre, mildiou du tabac.
Emploi **Cultures maraîchères (G),**	**Aubergine, tomate:** 0.05%, contre, *mildiou de la tomate*. Délai d'attente: 3 Jours. Traitement au début de l'attaque. 7 à 10 jours d'intervalle entre les traitements. Pour éviter le développement de résistances, 3 traitements au maximum par culture avec des produits du groupe de matières actives FRAC N° 21 (Quinone inside Inhibitors, QiI). Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 6 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de la dérive, conformément aux instructions du service d'homologation. **concombre, courges à peau comestible (plein air):** 0.05% (0.5lt/ha), contre, *mildiou des cucurbitacées*. Délai d'attente: 3 Jours. Traitement au début de l'attaque. Pour éviter le développement de résistances, 3 traitements au maximum par culture avec des produits du groupe de matières actives FRAC N° 21 (Quinone inside Inhibitors, QiI). Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 6 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de la dérive, conformément aux instructions du service d'homologation. Autorisé comme utilisation mineure selon l'art. 35 OPPh (minor use).

Grandes cultures (F),	**Cucurbitacées (serre):** 0.05% (0.5lt/ha), contre, *mildiou des cucurbitacées*. Délai d'attente: 3 Jours. Traitement au début de l'attaque. 7 à 10 jours d'intervalle entre les traitements. Pour éviter le développement de résistances, 3 traitements au maximum par culture avec des produits du groupe de matières actives FRAC N° 21 (Quinone inside Inhibitors, QiI). **pommes de terre:** 0.5 lt/ha, contre *mildiou de la pomme de terre*. Délai d'attente: 2 Semaine(s). 7 à 10 jours d'intervalle entre les traitements. Pour éviter le développement de résistances, 3 traitements au maximum par culture avec des produits du groupe de matières actives FRAC N° 21 (Quinone inside Inhibitors, QiI). 1 semaine de délai d'attente pour les pommes de terre primeurs. **Tabac:** 0.5 lt/ha, contre *mildiou du tabac*. Pour éviter le développement de résistances, 3 traitements au maximum par culture avec des produits du groupe de matières actives FRAC N° 21 (Quinone inside Inhibitors, QiI). Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 6 m par rapport aux eaux de surface. Cette distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de la dérive, conformément aux instructions du service d'homologation.
Mode d'action	Cyazofamid est une matière active du groupe de Cyanomidazole. Cyazofamid empêche le transport des électrons dans les mitochondries des cellules des champignons et bloque ainsi la respiration. La matière active entre dans la cire cuticulaire et n'est plus lessivée une heure après l'application.
Préparation de la bouillie	Préparation de la bouillie: verser le produit directement au travers du tamis dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. **Mélanges:** Ranman Top est miscible avec nos insecticides et engrais liquides. Les bouillies doivent être utilisées immédiatement. **Protection des utilisateurs:** Préparation de la bouillie: Porter des lunettes de protection ou une visière.
Rotation des cultures	Pas de restriction.
Classement	Danger  P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les

	risques pour la santé humaine et l'environnement. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Le produit est homologué par l'OSAV. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	1 lt. 5 lt.
®	Marque déposée par Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., Japan
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version11.03.25/RH/LG0960

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45

www.leugygax.ch