Ranman® Top

Fungicida

Fungicida altamente effi cace per patate, tabacco, pomodori e piante di zucca con effetto protettivo e antisporulatorio.

Prodotto	Ranman® Top è un sospensione concentrata (SC) e contiene 14.8 % (160 g/lt), cyazofamide.
Culture	Campicoltura (F), Orticoltura (G).
Spettro di efficacia	mildiou de la tomate, mildiou des cucurbitacées, mildiou de la pomme de terre, mildiou du tabac.
Applicazione Orticoltura (G),	**Cetrioli, Zucche con buccia commestibile, (Pieno campo):** 0.05 %, contro *Peronospora delle Cucurbitacee*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Trattamento a inizio infestazione. Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 3 trattamenti per coltura con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC numero 21 (Quinone inside Inhibitors, QiI). per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Cucurbitacee, (Serra):** 0.05 % (0.5 lt/ha), contro *Peronospora delle Cucurbitacee*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Trattamento a inizio infestazione. Trattamenti ad un intervallo di 7 - 10 giorni. Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 3 trattamenti per coltura con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC numero 21 (Quinone inside Inhibitors, QiI).

Campicoltura (F),	**Melanzana, Pomodori:** 0.05 %, contro *Peronospora del pomodoro*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Trattamento a inizio infestazione. Trattamenti ad un intervallo di 7 - 10 giorni. Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 3 trattamenti per coltura con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC numero 21 (Quinone inside Inhibitors, QiI). per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Patate:** 0.5 l/ha, contro *Peronospora della patata*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Trattamenti ad un intervallo di 7 - 10 giorni. Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 3 trattamenti per coltura con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC numero 21 (Quinone inside Inhibitors, QiI). Termine di attesa di 1 settimana per le patate primaticce. **Tabacco:** 0.5 l/ha, contro *Peronospora del tabacco*. Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 3 trattamenti per coltura con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC numero 21 (Quinone inside Inhibitors, QiI). Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
Modalità di azione	Il fungicida Ranman®Top ha un meccanismo d'azione unico, che consente una protezione molto efficace contro le infezioni da peronospora. Ranman®Top, applicato sulle foglie, non solo controlla la peronospora delle foglie, ma fornisce anche un'eccellente protezione dei tuberi. A differenza di molti altri fungicidi, Ranman®Top è efficace contro tutte le fasi dello sviluppo fungino. Ranman®Top è particolarmente efficace contro una varietà di Oomiceti, in particolare Phytophthora, Pythium e Plasmopara. Ranman®Top è un ottimo fungicida per garantire efficacemente le rese delle patate.
Preparazione del porridge	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità, miscelate i prodotti, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Ranman®Top è miscibile con i nostri fungicidi, i nostri insetticidi e con i nostri fertilizzanti fogliari. Le miscele devono essere distribuiti immediatamente. Conservazione: Conservare in un luogo fresco ma privo di gelo. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare occhiali di protezione o una visiera.

Scheda Tecnica

Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	Pericolo  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
imballaggio	1 lt. 5 lt.
®	Marchio registrato Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., Japan
Da notare	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Version 11.03.25/RH/RF/LG0960

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45

www.leugygax.ch