Rapid

Insetticida

Insetticida contro la carpocarpsa delle mele e delle prugne, la capua e la falena degli alberi da frutto, come pure diversi parassiti nelle colture orticole.

Prodotto	Rapid è un granulato solubile in acqua (SG) e contiene 0.95 % emamectina benzoato.
Colture	Campicoltura, Orticoltura, Frutticoltura, Coltivazione piante ornamentali.
Spettro di efficacia	Carpocarpsa delle mele, Cavolaie, Falene, Nottue (defogliatrici), Piccola tortrice dei frutti, Piralide del bosso, Tignola delle Crocifere, Tortrice del pisello, Tortrice delle susine, Tortrici ricamatrici, Tuta absoluta.
Applicazione Frutticoltura	**Albicocco, Pesco/pesco noce:** 0.2% (3.2 kg/ha), contro *Carpocarpsa delle mele, tignola del pesco, Tortrice orientale del pesco*. Termine d'attesa: 3 settimane. Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti emamectina benzoato più di due volte per anno e particella. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Solo in frutteti secondo l'art. 22 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (RS 910.91, OTerm). Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Può venir utilizzato solo impiegando un sistema che riduca la deriva di almeno il 75%. Nella piantagione così come in una fascia-tampone circostante di una larghezza di 3 m, le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere artropodi non

	bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 100 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Frutta a granelli:** 0.2% (3.2 kg/ha), contro *Carpocarpsa delle mele, Piccola tortrice dei frutti, Tortrici ricamatrici*. Termine d'attesa: 3 settimane. Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti emamectina benzoato più di due volte per anno e particella. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Solo in frutteti secondo l'art. 22 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (RS 910.91, OTerm). Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Può venir utilizzato solo impiegando un sistema che riduca la deriva di almeno il 75%. Nella piantagione così come in una fascia-tampone circostante di una larghezza di 3 m, le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 100 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Frutta a granelli:** 0.2% (3.2 kg/ha), contro *Falene, Tortrici ricamatrici*. Applicazione: prefioritura o postfioritura (BBCH 57-59 o 69-71). Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti emamectina benzoato più di due volte per anno e particella. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Solo in frutteti secondo l'art. 22 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (RS 910.91, OTerm). Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi).

	Può venir utilizzato solo impiegando un sistema che riduca la deriva di almeno il 75%. Nella piantagione così come in una fascia-tampone circostante di una larghezza di 3 m, le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 100 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Noce comune:** 0.2% (3.2 kg/ha), contro *Carpocarpsa delle mele*. Termine d'attesa: 3 giorni. Applicazione: a partire dall'inizio della schiusa delle larve. Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti emamectina benzoato più di due volte per anno e particella. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Solo in frutteti secondo l'art. 22 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (RS 910.91, OTerm). Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Può venir utilizzato solo impiegando un sistema che riduca la deriva di almeno il 75%. Nella piantagione così come in una fascia-tampone circostante di una larghezza di 3 m, le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 100 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

	Prugno/Susino: 0.2% (3.2 kg/ha), contro *Tortrice delle susine*. Termine d'attesa: 3 settimane. Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti emamectina benzoato più di due volte per anno e particella. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Solo in frutteti secondo l'art. 22 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (RS 910.91, OTerm). Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Può venir utilizzato solo impiegando un sistema che riduca la deriva di almeno il 75%. Nella piantagione così come in una fascia-tampone circostante di una larghezza di 3 m, le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 100 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Prugno/Susino:** 0.2% (3.2 kg/ha), contro *Tortrice delle susine*. Applicazione: Dopo la fioritura (BBCH ≥ 71). Termine d'attesa: 3 settimane. 1 trattamento per particella e anno di alberi da frutto ad alto fusto e semi-fusto. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m3/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle istruzioni del servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti secondo le istruzioni del servizio di omologazione. Per proteggere artropodi dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dai biotopi in virtù degli articoli 18a e 18b LPN. Tale distanza può essere ridotta se vengono applicate misure di riduzione della deriva conformemente alle istruzioni del Servizio di omologazione. Pericoloso per le api – Non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata. Prima del

	trattamento eliminare colture intercalari o malerbe in fiore (sfalcio o pacciamatura). Rispettare una fascia tampone non trattata di 50 metri da piante in fiore su particelle vicine. Tale distanza può essere ridotta se vengono applicate misure di riduzione della deriva conformemente alle istruzioni del servizio di omologazione. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del servizio di omologazione. Informazione affinché terze persone non entrino nella particella. Nessun trattamento, in presenza di persone non protette che potrebbero essere esposte alla deriva. Omologazioni in situazioni di emergenza, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010, sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2025.
Orticoltura	**Cavoli a infiorescenza, Cavoli a testa, Cavoli di Bruxelles, Cavoli fogliacei:** 0.15% (1.5 kg/ha), contro *Cavolaie, Nottue (defogliatrici), Tignola delle Crocifere*. Termine d'attesa: 1 settimana. Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti emamectina benzoato più di due volte per anno e particella. Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Cucurbitacee:** 0.15% (1.5 kg/ha), contro *Nottue (defogliatrici)*. Termine d'attesa: 3 giorni. Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti emamectina benzoato più di due volte per anno e particella. Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una

Campicoltura	zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Pomodori:** 0.15% (1.5 kg/ha), contro *Tuta absoluta*. Termine d'attesa: 3 giorni. Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti emamectina benzoato più di due volte per anno e particella. Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Pisello proteico:** 1.5 kg/ha, contro *Nottue (defogliatrici), Tortrice del pisello*. Applicazione: a partire dall'inizio dell'attacco. Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti emamectina benzoato più di due volte per anno e particella. Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
Coltivazione piante ornam.	**Bosso (Buxus):** 0.2%, contro *Piralide del bosso*. Applicazione: a partire dall'inizio dell'attacco. Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti emamectina benzoato più di due volte per anno e particella. er proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento,

	rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
Modalità di azione	Rapid agisce specificatamente contro le larve dei lepidotteri. Il vantaggio principale di questo prodotto, è di lottare contro la carpocarpsa, le quali sono resistenti ad altri insetticidi. La durata dell'efficacia è secondo le situazioni, di circa 2 a 3 settimane a causa della rapida degradazione della sostanza attiva nella natura. Rapid agisce sulle cellule nervose delle larve. Il prodotto, le priva della capacità di mangiare poco dopo il trattamento, ciò che permette di bloccare i danni nelle colture.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Rapid è mescolabile secondo consiglio della ditta LG. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. I lavori successivi nelle colture trattate sono possibili non prima di 48 ore dall'applicazione. È necessario indossare guanti protettivi e indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H302 Nocivo se ingerito.

	H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAF. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	1 kg. 5 kg.
®	
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni indicate.

Version 11.03.25/RH/RF/LG0000

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45

www.leugygax.ch