Revus®

Fungicida

Fungicida contro la peronospera delle patate e altre colture.

Prodotto	Revus è una sospensione concentrata (SC) e contiene 23.4 % (250 g/lt) di Mandipropamid. (W 6509)
Colture	Campicoltura e Orticoltura.
Spettro di efficacia	Peronospora della lattuga, Peronospora del carciofo, Peronospora del pisello, Peronospora dello spinaccio, Peronospora delle crucifere, Phytophthora cryptogea, Peronospora (diverse specie) su erbette da cucina, Peronospora delle ombrellifere, Peronospora della lattuga, Peronospora del luppolo, Peronospora della patata, Peronospora del tabacco.
Applicazione Orticoltura	**Baby-Leaf (Asteraceae):** 0.6 lt/ha, contro *Peronospora della lattuga*. Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco. Termine d'attesa: 7 Giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura. **Baby-Leaf (Brassicaceae):** 0.6 lt/ha, contro *Peronospora delle crucifere*. Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco. Termine d'attesa: 7 Giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Baby-Leaf (Chenopodiaceae) (Pieno campo):** 0.6 lt/ha, contro *Peronospora dello spinacio*. Applicazione: Stadi 14-18 (BBCH). Termine d'attesa: 7 Giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura ad un intervallo di 7 giorni. **Baby-Leaf (Chenopodiaceae) (Serra):** 0.6 lt/ha, contro *Peronospora dello spinacio*. Applicazione: Stadi 14-18 (BBCH). Termine d'attesa: 7 Giorni. Al massimo un 1 trattamento per coltura. **Bietola (Pieno campo):** 0.6 lt/ha, contro *Peronospora dello spinacio*. Termine d'attesa: 7 Giorni. Applicazione: Stadi 14-45 (BBCH). Al massimo 2 trattamenti per coltura ad un intervallo di 7 giorni.

	Bietola (Serra): 0.6 lt/ha, contro *Peronospora dello spinacio*. Termine d'attesa: 7 Giorni. Applicazione: Stadi 14-45 (BBCH). Al massimo un trattamento per coltura. **Carciofi:** 0.6 lt/ha, contro *Peronospora del carciofo*. Applicazione: Stadi 15- 55 (BBCH). Termine d'attesa: 7 Giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura ad un intervallo di 7 giorni. **Cavoli a infiorescenza (Pieno campo):** 0.6 lt/ha, contro *Peronospora delle crucifere*. Termine d'attesa: 14 Giorni Applicazione: Stadi 16-49 (BBCH). Al massimo 2 trattamenti per coltura con un intervallo di 10 giorni. **Cavoli di Bruxelles (Pieno campo):** 0.6 lt/ha, contro *Peronospora delle crucifere*. Termine d'attesa: 14 Giorni Applicazione: Stadi 16-49 (BBCH). Al massimo 2 trattamenti per coltura con un intervallo di 10 giorni. **Cicoria belga:** 0.5 ml/m^2, contro *Phytophthora cryptogea*. Termine d'attesa: 21 Giorni. Applicazione: 1 solo trattamento. ad inizio forzatura. Irrorazione delle radici. **Cima di rapa (Pieno campo):** 0.6 lt/ha, contro *Peronospora delle crucifere*. Termine d'attesa: 14 Giorni. Applicazione: Stadi 16-49 (BBCH). Al massimo 2 trattamenti per coltura con un intervallo di 10 giorni. **Erbette da cucina (Pieno campo):** 0.6 lt/ha, contro *Peronospora (diverse specie) su erbette da cucina*. Termine d'attesa: 7 Giorni Applicazione: Stadi 14-45 (BBCH). **Erbette da cucina (Serra):** 0.6 lt/ha, contro *Peronospora (diverse specie) su erbette da cucina*. Termine d'attesa: 7 Giorni Applicazione: Stadi 14-45 (BBCH). Al massimo un trattamento per coltura. **Finocchio dolce:** 0.6 lt/ha, contro *Peronospora delle ombrellifere*. Termine d'attesa: 14 Giorni. Applicazione: A partire dall'inizio dell'attacco. Al massimo 3 trattamenti a intervalli di 7 - 10 giorni. **Insalate (Asteracee):** 0.6 lt/ha, contro *Peronospora della lattuga*. Termine d'attesa: 7 Giorni. Applicazione: A partire dall'inizio dell'attacco. Al massimo 2 trattamenti per coltura.

	Insalate asiatiche (Brassicacee): 0.6 lt/ha, contro *Peronospora delle crucifere*. Termine d'attesa: 7 Giorni. Applicazione: A partire dall'inizio dell'attacco. Al massimo 2 trattamenti per coltura. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Piselli senza baccello:** 0.6 lt/ha, contro *Peronospora del pisello*. Applicazione: Stadi 35-59 (BBCH). Termine d'attesa: 14 Giorni. Al massimo 2 trattamenti per cultura con un intervallo di 10 giorni. **Prezzemolo:** 0.6 lt/ha, contro *Peronospora delle ombrellifere*. Termine d'attesa: 7 Giorni. Applicazione: A partire dall'inizio dell'attacco. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor uso). Al massimo 6 trattamenti per particella e anno. **Rafano rusticana, Ramolaccio:** 0.6 lt/ha, contro *Peronospora delle crucifere*. Termine d'attesa: 7 Giorni. Applicazione: Stadio 12-49 (BBCH). Al massimo 2 trattamenti per coltura ad un intervallo di 7 giorni. **Ramolaccio (Pieno campo):** 0.6 lt/ha, contro *Peronospora delle crucifere*. Termine d'attesa: 7 Giorni. Applicazione: Stadio 12-49 (BBCH). Al massimo 2 trattamenti per coltura ad un intervallo di 7 giorni. Al massimo 6 trattamenti per particella e anno. **Rucola:** 0.6 lt/ha, contro *Peronospora delle crucifere*. Termine d'attesa: 7 Giorni. Applicazione: A partire dall'inizio dell'attacco. Al massimo 2 trattamenti per coltura. **Spinaci (Pieno campo):** 0.6 lt/ha, contro *Peronospora dello spinaccio*. Termine d'attesa: 7 Giorni. Applicazione: Stadi 14-45 (BBCH). Al massimo 2 trattamenti per coltura ad un intervallo di 7 giorni. **Spinaci (Serra):** 0.6 lt/ha, contro *Peronospora dello spinacio*. Termine d'attesa: 7 Giorni. Applicazione: Stadi 14-45 (BBCH). Al massimo un 1 trattamento per coltura. **Rabarbaro:** 0.5 lt/ha, contro *Peronospora del rabarbaro*. Applicazione: dopo il raccolto al più tardi fino a fine agosto. Il prodotto non è stato testato alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia. Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 2 trattamenti per coltura con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC numero 40. Per evitare l'insorgenza di resistenza, nel trattamento successivo utilizzare un prodotto che non contenga un principio attivo del gruppo FRAC No. 40.

Campicoltura	Omologazioni in situazioni di emergenza, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010, sono autorizzati temporaneamente fino al 30 novembre 2025. **Cipolle:** 0.5 lt/ha, contro *Peronospora della cipolla, Marciume bianco della cipolla, Peronospora della cipolla, Ruggine delle Agliacee (Puccinia allii), Cladosporiosi degli ortaggi a bulbo*. Termine d'attesa: 3 settimane. Il prodotto non è stato testato alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia. Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 2 trattamenti per coltura con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC numero 40. Per evitare l'insorgenza di resistenza, nel trattamento successivo utilizzare un prodotto che non contenga un principio attivo del gruppo FRAC No. 40. Omologazioni in situazioni di emergenza, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010, sono autorizzati temporaneamente fino al 30 novembre 2025. **Luppolo:** 0.75-1.6 lt/ha, contro *Peronospora del luppolo*. Termine d'attesa: 14 Giorni. Applicazione: Stadi 31-87 (BBCH). Fino allo stadio 37 (BBCH): 0.75 l/ha. Fino allo stadio 57 (BBCH): 1 l/ha. A partire dallo stadio 55 (BBCH): 1.6 l/ha. Trattamenti a intervalli di 10-21 giorni. Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 2 trattamenti per anno e particella con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC numero 40. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. **Patate:** 0.6 lt/ha, contro *Peronospora della patata*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Termine di attesa di 1 settimana per le patate primaticce. Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 4 trattamenti per anno e particella con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC numero 40. **Tabacco:** 0.5 lt/ha, contro *Peronospora del tabacco*. Termine d'attesa: 7 Giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 2 trattamenti per anno e particella con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC numero 40.
Modalità di azione	Mandipropamid è una nuova materia attiva del gruppo degli amidi carbammati, il quale possiede delle proprietà speciali. La materia attiva, viene subito rinchiusa nello strato ceroso della pianta, così da essere assorbita sia dalle foglie che dallo stelo e trasportata nella parte inferiore della foglia (azione translaminare). Mandipropamid attacca diverse posizioni nel ciclo del fungo. Oltre che combattere l'inibizione germinativa delle spore (Oospore), le quali sono indispensabili per la crescita

	del fungo, esso frena la crescita del micelio nelle infezioni già avvenute. Dopo un trattamento con Revus, interviene immediatamente un arresto della crescita del fungo e le spore presenti vengono uccise. Il prodotto possiede un'azione protettiva, come pure un'azione curativa inoltre è presente un'azione che uccide le spore. Siccome la materia attiva viene assorbita, non solo dalle foglie ma anche dallo stelo delle piante di patate, possono venir combattute anche le infezioni peronosporiche dello stelo. Un altro vantaggio di Revus, è la forte resistenza alla pioggia. La materia attiva, viene rapidamente legata allo strato ceroso delle foglie, così da essere protetta dal lavaggio da parte della pioggia. Grazie al moderno effetto del Mandipropamide e al sensato impiego di altri prodotti, nella strategia di lotta, esiste un basso rischio di resistenza
Preparazione della poltiglia	Riempire a metà il serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderata, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Revus è miscibile con i nostri insetticidi e fungicidi.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	 P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	1 lt.
®	Marchio registrato Syngenta Group Company
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Version 25.02.25/RH/RF/LG0000

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch