Sambe-

Fongicide naturel pour la viticulture, l'arboriculture, les cultures maraîchères, les baies et les grandes cultures, et les grandes cultures






- ☑ **contre les champignons et bactéries pathogènes.**
- ☑ **Permet de renforcer la résistance de la plante.**
- ☑ **Sambesi est une substance de base et est autorisé par Bio Suisse et Demeter.**

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax SA

Propriétés spéciales de Sambesi

Le chitosane est utilisé avec succès dans la protection des cultures. L'ingrédient actif du Sambesi est une matière première renouvelable aux propriétés remarquables et utiles. La substance obtenue à partir de la chitine stimule le système immunitaire et a un effet antibactérien. Lorsque qu'il est utilisé correctement, il renforce les cultures. Celles-ci deviennent plus résistantes. Avec la cellulose la chitine est l'un des polymères les plus courant trouvés dans la nature, c'est-à-dire un composé moléculaire en forme de chaîne. C'est un composant majeur des parois cellulaires des champignons ainsi que des coquilles de crustacés.

Profil de Sambesi

Matière active:	5 % Chlorhydrate de chitosane
Emballage:	5 l

Miscibilité

Sambesi est miscible avec nos produits phytosanitaires.

Application et dosage

Baies (plein air): 2-16 lt/ha, contre *les champignons et bactéries pathogènes. Eliciteur, renforce la résistance de la plante.* Emploi: BBCH 10-71. Pulvériser, 4-8 traitements à 14 jours d'intervalle.

Fruits à pépins, à noyaux et à coque dure: 2-16 lt/ha, contre *les champignons et bactéries pathogènes. Eliciteur, renforce la résistance de la plante.* Emploi: BBCH 10-71. Pulvériser, 4-8 traitements à 14 jours d'intervalle.

Vigne: 2-16 lt/ha, contre *les champignons et bactéries pathogènes. Eliciteur, renforce la résistance de la plante.*
Emploi: BBCH 10-71. Pulvériser, 4-8 traitements à 14 jours d'intervalle.

Légumes: 2-8 lt/ha, contre *les champignons et bactéries pathogènes. Eliciteur, renforce la résistance de la plante.*
Emploi: BBCH 10-71. Pulvériser, 4-8 traitements à 14 jours d'intervalle.

Fines herbes: 2-8 lt/ha, contre *les champignons et bactéries pathogènes. Eliciteur, renforce la résistance de la plante.*
Emploi: BBCH 10-71. Pulvériser, 4-8 traitements à 14 jours d'intervalle.

Céréales: 2-8 lt/ha, contre *les champignons et bactéries pathogènes. Eliciteur, renforce la résistance de la plante.*
Emploi: BBCH 10-71. Pulvériser, 4-8 traitements à 14 jours d'intervalle.

Céréales (désinfection des semences): 1-4 lt/100 lt d'eau, contre *les champignons et bactéries pathogènes. Eliciteur, renforce la résistance de la plante.* Emploi: avant le semis.
1 traitement.

Cultures fourragères : 2-8 lt/ha, contre *les champignons et bactéries pathogènes. Eliciteur, renforce la résistance de la plante.* Emploi: BBCH 10-71. Pulvériser, 4-8 traitements à 14 jours d'intervalle.

Pommes de terre (désinfection des semences): 1-4 lt/100 lt d'eau, contre *les champignons et bactéries pathogènes. Eliciteur, renforce la résistance de la plante.* Emploi: avant de poser les tubercules.
1 traitement.

Betteraves sucrières (désinfection des semences): 1-4 lt/100 lt d'eau (1-4 %), contre *les champignons et bactéries pathogènes. Eliciteur, renforce la résistance de la plante.* Emploi: avant le semis.
1 traitement.

Leu+Gygax SA
5413 Birmenstorf AG, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch / info@leugygax.ch

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.