Siltac® plus

Solution innovante pour combattre les insectes dans les cultures de baies, arboriculture, viticulture, grandes cultures, cultures maraîchères, plantes ornementales et sylviculture



- **Haute efficacité contre les acariens tétranyques, ériopyides, gallicoles, psylles, pucerons et mouches blanches.**
- **Réduit la population des thryps**
- **Aucuns effets sur les abeilles et bourdons**

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45


www.leugygax.ch

Leu+Gygax SA

Caractéristiques spéciales du Siltac® plus

Siltac® plus est une innovation révolutionnaire. Il utilise un mécanisme purement physique pour lutter contre les insectes nuisibles et est basé sur la technologie 3D-IPNS (structure de réseau polymère immobilisant en trois dimensions).

Siltac® plus contient des substances polymères, principalement faites de polymères de silicone. Après application sur les plantes, ces composés produisent une structure de réseaux spécifiques à la surface du corps des organismes nuisibles. Au niveau moléculaire il s'agit d'un réseau polymérique tridimensionnel. La structure immobilise immédiatement les parasites. (à la façon d'un filet).



Contrairement aux produits chimiques, **Siltac® plus** n'a aucun effet toxique ou biochimique dans la stratégie de lutte antiparasitaire. Le produit ne contient aucunes matières actives nocives, donc l'application ne conduit pas à laisser des résidus indésirables. En raison de son mode d'action physique, il ne contribue pas à créer des résistances à long terme même si il est utilisé plusieurs fois.

De ce fait **Siltac® plus** convient parfaitement à la lutte intégrée des cultures. Il représente donc une alternative intelligente à la lutte chimique des ravageurs.

Profil de Siltac® plus

Matières actives: composés polymères


Specification:  GHS07, GHS09

Emballages: 5 l et 1 l

Utilisation du Siltac® plus


Pour une lutte antiparasitaire adéquate, il convient de pulvériser très soigneusement tous les sites où se trouvent les parasites. **Siltac® plus** ne fonctionne seulement si il est appliqué directement sur les organismes nuisibles (effet de contact). Ne pas surdoser, appliquez par temps sec, le produit doit sécher rapidement, ne fonctionne pas en préventif.








Efficacité de Siltac® plus contre le pou de cerise noire (Rhopalosiphum padi (L) dans les céréales)






Efficacité de Siltac® plus contre les pucerons dans les féveroles (Aphis fabae)






Efficacité de Siltac® plus contre les pucerons (aphis) sur les carottes






Efficacité de Siltac® plus contre contre le puceron vert de la pomme (Aphis pomi) sur les pommiers (essai sur le terrain)





Efficacité de Siltac® plus contre les mouches blanches (Trialeurodes vaporariorum) - animaux adultes, sur le gerbera (test sous serre)



Utilisation et dosage

Respectez la concentration (ne pas surdoser)

		Dosage	Application
Cultures de baies:		0,12-0,15%	*contre acariens tétranyques, ériophyides, pucerons, mouches blanches, thrips.* 500-800 lt d'eau/ha, dès le début de la végétation jusqu'à BBCH 59 ensuite de BBCH 70-89. 2-3 applications à intervalle de 7-10 jours.
Arboriculture: (Fruits à pepins):	**Pommier**	0,12-0,15%	*contre acariens tétranyques, ériophyides, ériophyides, gallicoles, psylles, pucerons.* 500-800 lt d'eau/ha application de BBCH 51 à 59 et BBCH 70 à 89. Restrictions d'utilisation, sur pommiers et poiriers afin d'éviter des dommages du à la phytotoxicité, les traitements doivent être effectués la journée par temps sec afin que le produit sèche rapidement. Une bruine ou fine pluie dans les 8-10 heures suivant l'application peut faire augmenter le risque de phytotoxicité.
	Poirier	0,1%	
Arboriculture: (Fruits à noyaux):		0,12-0,15%	*Contre acariens tétranyques, ériophyides, ériophyides, gallicoles, pucerons, thrips.* 500-800 lt d'eau/ha. Application de BBCH 51 à 59 et de BBCH 70 à 89.
Cultures maraîchères:	**Concombres:**	0,1%	*Contre pucerons, acariens, mouches blanches, thrips.* 500-800 lt d'eau/ha. Application seulement par temps sec durant la journée. Le produit doit sécher rapidement. Prudence sur les plantes en floraison.
Tomates, poivrons, Aubergines:		0.05-0.07%	*Contre pucerons, acariens, mouches blanches, thrips.* 500-800 lt d'eau/ha. Application seulement par temps sec durant la journée. Le produit doit sécher rapidement. Prudence sur les plantes en floraison.
Autres légumes:		0.1-0.15%	*Contre pucerons, acariens, ériophyides, mouches blanches, thrips.* 500-800 lt d'eau/ha. Application seulement par temps sec durant la journée. Le produit doit sécher rapidement. Prudence sur les plantes en floraison.
Céréales:		0.15%	*Contre pucerons.* 400 lt d'eau/ha. Application seulement par temps sec. Le produit doit sécher rapidement.
Arbres et arbustes:		0.1-0.15%	*Contre pucerons, acariens, psylles, mouches blanches, thrips.* 500-1000 lt d'eau/ha.
Rosiers:		0.1%	*Contre acariens, pucerons, psylles, mouches blanches, trips.* 500-800 lt d'eau/ha.
Fleurs et plantes vertes:		0.05%	*Contre acariens, pucerons, psylles, mouches blanches, trips.* 500-1000 lt d'eau/ha. Application seulement par temps sec. Le produit doit sécher rapidement. Prudence sur les plantes en floraison.

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Leu+Gygax AG
5413 Birmenstorf AG, Tél. 056 201 45 45
www.leugygax.ch / info@leugygax.ch