Silwet® L-77

Prodotto umidificante e adesivante

Prodotto umidificante e adesivante come additivo per liquidi spray.

Prodotto	Silwet® L-77 è una concentrato emulsionato (EC) e contiene 84 % (846 g/lt) Polyalkyleneoxide modified Heptamethyltrisiloxane. (W-6406)
Culture	Campicoltura (F), Coltivazione di bacche (B), Coltivazione piante ornam. (Z), Frutticoltura (O), Orticoltura (G), Selvicoltura (S), Superfici non coltive (N), Viticoltura (W)
Spettro di efficacia	Aumento del potere umidificante e adesivante
Applicazione **Coltivazione di bacche (B)**	**Coltivazione di bacche in generale:** 0.025-0.05 % (0.1 lt/ha), alla *Aumento del potere umidificante e adesivante*. Quantità d'acqua consigliata 200-500 lt/ha.
Frutticoltura (O)	**Frutticoltura in generale:** 0.025-0.05 % (0.1 lt/ha), alla *Aumento del potere umidificante e adesivante*. Quantità d'acqua consigliata 200-500 lt/ha.
Viticoltura (W)	**Vite:** 0.025-0.05 %(0.1 lt/ha), alla *Aumento del potere umidificante e adesivante*. Quantità d'acqua consigliata 200-500 lt/ha.
Orticoltura (G)	**Orticoltura in generale:** 0.1 lt/ha, alla *Aumento del potere umidificante e adesivante*. Quantità d'acqua consigliata 200-500 lt/ha.
Campicoltura (F)	**Cereali fungicidi, insetticidi:** 0.1 lt/ha, alla *Aumento del potere umidificante e adesivante*. Quantità d'acqua consigliata 150-200 lt/ha. **Cereali, fungicidi per spighe:** 0.1 lt/ha, alla *Aumento del potere umidificante e adesivante*. Quantità d'acqua consigliata 150 lt/ha.

	Barbabietole fungicidi, insetticidi: 0.1 lt/ha, alla *Aumento del potere umidificante e adesivante*. Quantità d'acqua consigliata 200-300 lt/ha. **Colza fongicides, insecticides:** 0.1 lt/ha, alla *Aumento del potere umidificante e adesivante*. Quantità d'acqua consigliata 150-200 lt/ha. **Papavero fongicides, insecticides:** 0.1 lt/ha, alla *Aumento del potere umidificante e adesivante*. Quantità d'acqua consigliata 150-200 lt/ha. **Legumi fongicides, insecticides:** 0.1 lt/ha, alla *Aumento del potere umidificante e adesivante*. Quantità d'acqua consigliata 150-200 lt/ha. **Mais fongicides, insecticides:** 0.1 lt/ha, alla *Aumento del potere umidificante e adesivante*. Quantità d'acqua consigliata 150-200 lt/ha. **Girasole fongicides, insecticides:** 0.1 lt/ha, alla *Aumento del potere umidificante e adesivante*. Quantità d'acqua consigliata 150-200 lt/ha. **Patate (15-20 cm di altezza):** 0.1 lt/ha, alla *Aumento del potere umidificante e adesivante*. Quantità d'acqua consigliata 120 lt/ha. **Patate (20-65 cm di altezza):** 0.1 lt/ha, alla *Aumento del potere umidificante e adesivante*. Quantità d'acqua consigliata 200 lt/ha. **Patate (altezza superiore a 65 cm):** 0.1 lt/ha, alla *Aumento del potere umidificante e adesivante*. Quantità d'acqua consigliata 250 lt/ha. **Luppolo:** 0.025-0.05 % (0.1 lt/ha), alla *Aumento del potere umidificante e adesivante*. Quantità d'acqua consigliata 750-1500 lt/ha. **Diserbante fogliare:** 0.1 lt/ha, alla *Aumento del potere umidificante e adesivante*. Quantità d'acqua consigliata 100-200 lt/ha. **Diserbante residuale:** 0.1 lt/ha, alla *Aumento del potere umidificante e adesivante*. Quantità d'acqua consigliata 200 lt/ha.
Coltivazione piante ornam. (Z)	**Coltivazione piante ornam. in generale:** 0.025-0.05 % (0.1 lt/ha), alla *Aumento del potere umidificante e adesivante*. Quantità d'acqua consigliata 200-500 lt/ha.

Selvicoltura (S) **Superfici non coltive (N)**	**Selvicoltura in generale:** 0.025-0.05 % (0.1 lt/ha), alla *Aumento del potere umidificante e adesivante*. Quantità d'acqua consigliata 200-500 lt/ha. **Superfici non coltive in generale:** 0.1 lt/ha, alla *Aumento del potere umidificante e adesivante*. Quantità d'acqua consigliata 150-200 lt/ha.
Modalità di azione	Silwet® L-77 è un prodotto umidificante e adesivante non ionico, riduce estremamente la tensione superficiale dei liquidi spray. Questo porta ad un risultato eccellente di una bagnatura e una migliore distribuzione di spruzzatura praticamente su tutte le superfici (piante o terreno).
Preparazione della miscela spray	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità, miscelate i prodotti, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Silwet® L-77 mescolabile secondo le indicazioni del consulente Leu+Gygax AG. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare una maschera di protezione per le vie respiratore (A2) + occhiali di protezione. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H319 Provoca grave irritazione oculare. H332 Nocivo se inalato. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
imballaggio	1 lt
®	Marchio registrato General Electric Co., USA

Da notare	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Version 11.03.25/RH//LG1080

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch