Simplex®

Zur Bekämpfung von Problemunkräuter wie Blacken, Giftige Kreuzkräuter, Japanischer Knöterich, Brombeeren und vieles mehr.



- ☑ **selektives Herbizid gegen zweikeimblättrige Unkräuter**
- ☑ **Anwendung im Feldbau, Biodiversitätförderflächen gemäss DZV und Nichtkulturland.**

5413 Birmenstorf, Telefon 056 201 45 45

www.leugygax.ch

Leu+Gygax AG

Anwendung und Dosierung von Simplex

Anwendung	Schaderreger	Dosierung	Wartefrist
Wiesen und Weiden	Brombeersträucher Giftige Kreuzkräuter (Senecon spp.) Japanischer Knöterich	1 %	3 Wochen
Wiesen und Weiden	Grosse Brennnessel Rumex-Arten	0.5 %	3 Wochen
Wiesen und Weiden	Rumex-Arten	2.5 %	3 Wochen
Auf und an National- und Kantonsstrassen, Böschungen und Grünstreifen entlang von Verkehrswegen	Aufrechtes Traubenkraut (Ambrosia Grosartemisiifolia), Brombeersträucher, Giftige Kreuzkräuter (Senecio spp.), Japanischer Knöterich, Mehrjährige Disteln	1 %	
Auf und an National- und Kantonsstrassen, Böschungen und Grünstreifen entlang von Verkehrswegen	Grosse Brennnessel Stumpfblättrige Ampfer (Blacken)	0.5 %	
Grünflächen	Brombeersträucher Giftige Kreuzkräuter (Senecon spp.) Mehrjährige Disteln	1 %	3 Wochen
Grünflächen	Japanischer Knöterich	1 %	3 Wochen
Grünflächen	Rumex-Arten	0.5 %	3 Wochen
Offene Ackerfläche	Brombeersträucher Giftige Kreuzkräuter (Senecon spp.) Mehrjährige Disteln	1 %	3 Wochen
Offene Ackerfläche	Japanischer Knöterich	1 %	3 Wochen
Offene Ackerfläche	Rumex-Arten	0.5 %	3 Wochen

Besondere Eigenschaften von Simplex

Die systemischen Wirkstoffe Aminopyralid und Fluroxypyr werden über die Blätter aufgenommen und anschliessend in den Pflanzen systemisch verteilt. Die rasch einsetzende Wirkung erkennt man an Verdrehungen der Blätter und Triebe. Durch die Verlagerung des Wirkstoffs bis in die Wurzeln wird eine gute Dauerwirkung erzielt.

Wirkungsspektrum

Aufrechtes Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia), Brombeersträucher, Giftige Kreuzkräuter (Senecio spp.), Grosse Brennnessel, Japanischer Knöterich, Mehrjährige Disteln, Rumex-Arten, Stumpfblättriger Ampfer (Blacken) und viele andere.

Zu beachten

Simplex darf nur als Einzelpflanzenbehandlung angewendet werden. Entweder mit der Rückenspritze oder mit Handspritzgeräten. Zum Schutz von Grundwasser dieses Pflanzenschutzmittel oder andere Aminopyralid-haltige Pflanzenschutzmittel nicht mehr als 1 mal alle 2 Jahre auf derselben Parzelle anwenden.

Produktprofil von Simplex

Wirkstoffe:	9.8 % Fluroxypyr 2.96 % Aminopyralid
Packungsgrösse:	1 l

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikette und Produkteinformationen lesen.

® Reg. Marke der Corteva, USA

Leu+Gygax AG
5413 Birmenstorf AG, Telefon 056 201 45 45
www.leugygax.ch / info@leugygax.ch