Scheda tecnica

Soleto ®

Erbicida

Erbicida di preemergenza per combattere le malerbe dicotiledoni e le graminacee nelle colture orticole e nella campicoltura.

Prodotto	Soleto è una sospensione concentrata (SC) e contiene 500 g/l de métobromuron.
Colture	Campicoltura e Orticoltura.
Spettro di efficacia	**Buona efficacità** : Senape, camomilla, amaranto, papavero, galinsona, erba morella, cheropodio, portulacca, borsa a pastore, erba gallina, coda di volpe comune, sanguinella, falsopanico, giavone, agrostide dei campi. **Efficacità parziale** : Poligono persicaria, poligono convolvolo, poligono avicolare, senecio volgare.
Applicazione **Orticoltura**	**Valerianella [seminato] (Pieno campo):** 0.5-1 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza. Al massimo 1 trattamento per anno e particella. In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di rientrare. Dose d'applicazione più bassa per i suoli sabbiosi e poveri di humus; dose più elevata per i suoli pesanti e poveri di humus. **Valerianella [seminato] (Serra):** 0.5-0.75 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza. Al massimo 1 trattamento per anno e particella. In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi.
Campicoltura	**Girasole, Soia:** 2-3 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza. Al massimo 1 trattamento per anno e particella. per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta

	attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Patate:** 3-4 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza. Al massimo 1 trattamento per anno e particella. Per proteggere le piante dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG
Modalità di azione	Soleto contiene la materia attiva Metobromurone, il quale fa parte del gruppo delle uree sostitutive. L'assorbimento di Soleto da parte delle malerbe, viene effettuato principalmente tramite il sistema radicale e sistematicamente trasportato via fasci legnosi (xilemi) verso le foglie delle malerbe. Soleto si lega specificatamente ai cloropasti interrompendo la fotosintesi e i processi nutritivi, conducendo alla distruzione la membrana cellulare. I sintomi apparenti che appaiono sulle malerbe trattate, si notano al debutto della fotosintesi e mostrano dei segni di clorosi e di necrosi sulle foglie. A ragione delle sue proprietâ fisico-chimiche, favorevoli Soleto, conviene particolarmente bene come erbicida per il suolo.
Preparazione della poltiglia	Riempire a metà il serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, quindi riempire il serbatoio completamente con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Soleto é miscibile con i nostri erbicidi. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
Rotazione delle colture	Nel quadro di una normale rotazione sia la colza o alter crucifere, come pure le barbabietole possono essere seminate, dopo una lavorazione del terreno. Le altre colture possono essere seminate, senza alcuna restrizione.
Classificazione	Attenzione 

	P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 208 Contiene métobromurone. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H351 Sospettato di provocare il cancro. H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	1 lt. 5 lt.
®	Marchio registrato Belchim Crop Protection.
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Version 18.03.24/RH/RF/LG1170

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch