Spray Oil 7-E

Acaricida, Insetticida

Olio minerale con un sistema emulsionabile speciale, per lottare contro insetti e per evitare il trasporto di virosi, tramite gli afidi.

Prodotto	Spray Oil 7-E è una emulsione concentrata (EC) e contiene 99.1% (830 g/l) Olio di paraffina. (W-2008)
Colture	Campicoltura, Coltivazione di bacche, Coltivazione piante ornamentali, Frutticoltura e Viticoltura.
Spettro di efficacia	Cocciniglie del genere lecanio, Cocciniglie ostreiformi, Falene, Ragnetti, Eriofidi, Ragnetto rosso, Afidi vettori di virus, Effetto secondario: Acariosi della vite, Eriofide della vite.
Applicazione **Coltivazione di bacche**	**Mini-Kiwi:** 3.5% contro *Cocciniglie del genere lecanio, Cocciniglie ostreiformi, Falene, Ragnetti*. Applicazione: Stadi BBCH 00-10 (B-C). **Mirtillo:** 3.5% (35 lt/ha), contro *Cocciniglie del genere lecanio, Cocciniglie ostreiformi, Falene, Ragnetti*. Applicazione: Stadi BBCH 00-10 (B-C). La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 00-10 (B-C), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1000 l/ha (base per il calcolo). **Sambuco nero:** 3.5%, contro *Falene, Ragnetti*. Applicazione: Stadi BBCH 00-10 (B-C). **Specie di ribes:** 3.5% (35 lt/ha), contro *Cocciniglie del genere lecanio, Cocciniglie ostreiformi, Falene, Ragnetti*. Applicazione: Stadi BBCH 00-10 (B-C). La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 00-10 (B-C), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1000 l/ha (base per il calcolo). **Frutticoltura** **Frutta a granelli:** 3% (56 lt/ha), contro *Cocciniglie del genere lecanio, Cocciniglie ostreiformi, Eriofidi, Falene, Ragnetto rosso*. Applicazione: Stadi BBCH 51-53. La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m^3/ha.

Viticoltura	**Frutta a granelli:** 2% (32 lt/ha), contro *Ragnetto rosso*. Applicazione: Stadi BBCH 54-56 (D). La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. **Frutta a granelli:** 1% (16 lt/ha), contro *Ragnetto rosso*. Applicazione: Stadi BBCH 57-58 (D3-E). La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. **Frutta a nocciolo:** 3.5% (56 lt/ha), contro *Cocciniglie del genere lecanio, Cocciniglie ostreiformi, Eriofidi, Falene, Ragnetto rosso*. Applicazione: Stadi BBCH 51-53. La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. **Frutta a nocciolo:** 1% (16 lt/ha), contro *Ragnetto rosso*. Applicazione: Stadi BBCH 57-58 (D3-E). La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. **Frutta a nocciolo:** 2% (32 lt/ha), contro *Ragnetto rosso*. Applicazione: Stadi BBCH 54-56 (D). La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. **Frutta con guscio:** 3.5% (56 lt/ha), contro *Cocciniglie del genere lecanio, Cocciniglie ostreiformi, Eriofidi, Falene*. Applicazione: Stadi BBCH 51-53. La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. **Melo, Pero/Nashi, Prugno/Susino:** 1% (16 lt/ha), contro *Pseudococcus comstocki*. Applicazione: dopo la fioritura. I prodotti non sono stati testati contro Pseudococcus comstocki in condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia e l'assenza di fitotossicità. Un unico trattamento dopo la fioritura soltanto su indicazione dei servizi fitosanitari cantonali. Trattamento a distanza di almeno 7 giorni dal trattamento antecedente e dal trattamento successivo con altri prodotti. Il dosaggio indicato si riferisce a un volume delle siepi di 10 000 m³/ha. Omologazioni in situazioni di emergenza, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010, sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2024. **In generale:** 2% (16 lt/ha), contro *Ragnetti*. Effetto secondario: *Acariosi della vite, Eriofide della vite*. Applicazione: Stadi BBCH 07-10 (C-D). La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 07-10 (C-D), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 800 l/ha (base per il calcolo).

Scheda tecnica

Campicoltura **Coltivazione piante ornamentali**	**In generale:** 1% (6 lt/ha), contro *Ragnetti*. Effetto secondario: *Acariosi della vite, Eriofide della vite*. Applicazione: Stadi BBCH 11-12 (E). La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 11-12 (E), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 600 l/ha (base per il calcolo). **Patate per la produzione di tuberi-seme:** 2% (7 lt/ha), contro *Afidi vettori di virus*. Trattamenti in 350 l d'acqua 1 x alla settimana, dopo la levata del 30% delle piante. **Arbusti ornamentali (al di fuori della foresta), Siepi (al di fuori del bosco):** 3.5%, contro *Cocciniglie del genere lecanio, Cocciniglie ostreiformi, Falene, Ragnetto rosso*. Applicazione: Prodotto per irrorazione invernale. Soltanto in orti familiari. Può causare danni fitotossici su piante ornamentali dalle foglie tenere, su oleandro, felci e fiori. Il trattamento deve essere terminato prima del germogliamento delle siepi.
Modalità di azione	Spray Oil 7E possiede due meccanismi di azione. Diretto, il prodotto forma una pellicola attorno agli insetti, impedendo così la loro respirazione. Indiretto, Spray Oil 7E forma una pellicola sulla superficie delle piante. Questa influenza l'assunzione di nutrimento e la deposizione delle uova da parte degli insetti.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Spray-Oil 7^{E} è miscibile con i nostri fungicidi.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione
Classificazione	Pericolo  Autorizzato per l'utilizzazione non professionale. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
imballaggio	10 lt. 25lt.
®	

Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Version 01.02.24/RH/RF/LG0843

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch