SPRINTER®

Herbicide systémique pour les cultures céréalières.



- ✓ **Très large spectre d'activité sur les mauvaises herbes et les graminées les plus importantes.**
- ✓ **Application jusqu'au stade BBCH 30-32.**
- ✓ **Aucune restriction de variétés sur les cultures homologuées.**

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45

www.leugygax.ch

Leu+Gygax SA

Particularités de Sprinter®

Application au printemps 220g/ha dès le stade 2 feuilles jusqu'au début montaison (30).
Pour lutter contre les graminées, les mauvaises herbes annuelles, les 3 matières actives sont absorbées par les feuilles puis se répartissent dans toute la plante. Au moment du traitement, les mauvaises herbes doivent être levées. L'agrostide peut être traité jusqu'au début montaison. Le vulpin des champs est mieux combattu au stade 3-4 feuilles. Contre les bromes, la meilleure efficacité est obtenue avec 2 traitements (7-10 jours). Le dosage par split est de 135g/ha + 0.65 l/ha de mouillant. Une météo favorable à la croissance améliore l'effet. Une heure après l'application, le sprinter ne sera plus lessivé.

Profil de Sprinter®

Matières actives: 6,83 % Pyroxsulam
2,28 % Florasulam
6,83% Cloquintocet-mexyl

Formulation: Granulé dispersible dans l'eau (WG)

Etiquetage:



EUH208	Contient Pyroxsulam, Cloquintocet-metxyl. Peut produire des réactions allergiques.
EUH401	Pour éviter les risques pour les humains et l'environnement. Suivez les instructions d'utilisation.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets à long terme.
SP1	Ne pas laisser le produit et/ou son récipient pénétrer dans les eaux.

Emballage: 400 g + 2 l mouillant Sprinter

Cultures	Dosages	Périodes d'application	Miscibilité
Epeautre, blé de printemps, triticale, seigle d'hiver, blé d'hiver,	220-275 g/ha 130 g/ha + mouillant	pulvérisation au stade 12-30 (BBCH) pulvérisation au stade 12-32 (BBCH)	miscible avec Biathlon et Monitor

A faible dose au stade 31-32 le sprinter perd une partie de son efficacité sur les ray-grass, la folle avoine, le pâturin annuel et les bromes.

SPRINTER®



Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Spectre d'efficacité

+++	Vulpin
+++	Folle-avoine
+++	Pâturin commun
+++	Raygras
+++	Agrostide jouet du vent
++	Pâturin annuel
++	Brôme faux-seigle
++	Brôme stérile
+++	Pensée des champs
+++	Repousses de colza
+++	Repousses de tournesol
+++	Rumex
+++	Véronique agreste
+++	Véronique des champs
+++	Véronique Perse
+++	Ravenelle
+++	Tabouret des champs
+++	Bourse-à-pasteur
+++	Ortie royale
+++	Ciguë

+++	Anthémis
+++	Camomille
+++	Gaillet
+++	Renouée à f. oseille
+++	Renouée persicaire
+++	Renouée faux liseron
+++	Bleuet
+++	Coquelicot
+++	Geranium
+++	Myosotis
+++	Vesce
++	Chardon des champs
++	Galinsoga
++	Laiteron maraîcher
++	Chénopode
++	Renouée des oiseaux
++	Séneçon
++	Morelles
++	Liserons

Leu+Gygax SA
5413 Birmenstorf AG, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch / info@leugygax.ch