Stabilan® plus

Chlorméquat



- ✓ **Protège contre la verse des céréales par raccourcissement les internodes.**
- ✓ **Dans les céréales miscible avec les herbicides en application précoce.**

5413 Birmenstorf, Tél. 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax SA

Spectre d'efficacité

Augmentation de la résistance à la verse, inhibition de la croissance des organes aériens.

Mode d'action

Stabilan® plus est un régulateur de croissance systémique. **Stabilan® plus** plus influence la synthèse gibbérellique et réduit l'élongation des cellules, menant à des plantes plus courtes avec une résistance à la verse améliorée. **Stabilan® plus** peut aussi favoriser la formation de la chlorophylle et la croissance des racines.

Profil du produit

Formulation: SL - concentré soluble dans l'eau

Matière active: 33 % Chlorméquat 357 g/l [sous forme 42.5% de Chlormequatchlorid

Classification GHE:

Attention



GHS 07

Application

Blé d'automne, Blé de printemps, Épeautre, Triticale:	0.5-2.5 lt/ha, a *augmentation de la résistance à la verse.* Application: dernier traitement au stade BBCH 30 pulvérisation. 1 traitement au maximum par culture et par année.
Arbres et arbustes (hors fôret), floriculture et plantes vertes, rosier:	0.1-0.5 %, a *inhibition de la croissance des organes aériens.* Application: arroser. Travaux successifs: porter des gants de protection + une tenue de protection jusqu'à 48 heures après l'application du produit. En cas d'utilisation dans une serre, celle-ci doit être aérée soigneusement avant d'y entrer à nouveau. Seulement pour des plantes en pot et en container.
Arbres et arbustes (hors fôret), floriculture et plantes vertes, rosier:	0.15-2 %, a *inhibition de la croissance des organes aériens.* Application: pulvérisation. En cas d'utilisation dans une serre, celle-ci doit être aérée soigneusement avant d'y entrer à nouveau.



Miscibilité

Stabilan® plus est miscible avec nos herbicides et fongicides. Lors des mélanges avec les hormones, réduire la dose de Stabilan® plus de 30%. Lors des mélanges avec des produits contenant du Dicamba, réduire la dose de Stabilan® plus de 50%. Ne pas utiliser les mélanges triples avec Stabilan® plus + sulfonylurée + fongicide.

Important
Traiter seulement les parcelles de céréales suffisamment pourvues en azote. Eviter les dérives sur les cultures voisines.

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Leu+Gygax SA
5413 Birmenstorf AG, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch / info@leugygax.ch