Stabilan® plus

Chlormequat



- ✓ **Protegge dall'allettamento dei cereali accorciando gli internodi.**
- ✓ **Nei cereali è miscibile con gli erbicidi nelle applicazioni precoci.**

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax SA

Spettro d'azione

Maggiore resistenza all'allettamento, inibizione della crescita degli organi aerei.

Modalità d'azione

Stabilan® plus è un regolatore di crescita sistemico. **Stabilan® plus** influenza la sintesi gibberellica e riduce l'allungamento cellulare, portando a piante più corte e con una migliore resistenza all'allettamento. **Stabilan® plus** può anche promuovere la formazione di clorofilla e la crescita delle radici.

Profilo del prodotto

Formulazione: concentrato solubile in acqua

Principio attivo: 33 % Chlormequat 357 g/l [sotto forma 42.5% di Chlormequatchloride (460g/l)]

Classification GHE:

Attenzione



GHS 07

Applicazione

Grano autunnale, grano primaverile, Farro, Triticale:	0,5-2,5 lt/ha, *aumenta la resistenza all'allettamento*. Applicazione: Ultimo trattamento allo stadio BBCH 30. Massimo 1 trattamento per coltura all' anno.
Alberi e arbusti (fuori foresta), floricoltura e piante verdi, rose:	0,1-0,5%, *inibisce la crescita degli organi aerei.* Applicazione: innaffiare. Lavori successivi: indossare guanti e indumenti protettivi fino a 48 ore dopo l'applicazione del prodotto. In caso di utilizzo in serra, la serra deve essere accuratamente ventilata prima di rientrare. Solo per piante in vaso e in contenitore.
Alberi e arbusti (fuori foresta), floricoltura e piante verdi, rose:	0,15-2 %, ha *inibito la crescita degli organi aerei.* Applicazione: spruzzare. In caso di utilizzo in serra, la serra deve essere accuratamente ventilata accuratamente prima di rientrare.



Miscibilità

Stabilan® plus è miscibile con i nostri erbicidi e fungicidi. In caso di miscela con ormoni, ridurre la dose di Stabilan® plus del 30%. In caso di miscela con prodotti contenenti Dicamba, ridurre la dose di Stabilan® di oltre il 50%. Non utilizzare miscele triple con Stabilan® plus + sulfonilurea + fungicida.

Importante
Trattare solo appezzamenti di cereali con azoto sufficiente. Evitare la deriva alle colture vicine.

Utilizzate i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'utilizzazione leggere le etichette e le informazioni concernente il prodotto.

Leu+Gygax SA
5413 Birmenstorf AG, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch / info@leugygax.ch