Stabilan® plus

Wachstumsregulator

Wachstumsregulator für Getreide und Zierpflanzen.

Produkt	Stabilan plus ist ein (SL) wasserlösliches Konzentrat und enthält 33 % (357 g/l) Chlormequat [als 42.5% Chlormequatchlorid (460 g/l)]. (W-3072).
Anwendungsbereich	Feldbau (F), Zierpflanzenbau (Z).
Wirkungsspektrum	Erhöhung der Standfestigkeit, Hemmung des Längenwachstums (Stauchen).
Anwendung **Feldbau** **Zierpflanzenbau**	 **Korn (Dinkel), Sommerweizen, Triticale, Winterweizen:** 0.5 - 2.5l/ha, zur *Erhöhung der Standfestigkeit*. Anwendung: letzte Behandlung bei BBCH-Stadium 30 Spritzapplikation. Maximal 1 Behandlung pro Kultur und Jahr. In 300-600 l Wasser/ha. Ueber die kombinierte Anwendung mit Herbiziden (Tankmischung) geben die jeweiligen Packungsaufschriften der Unkrautbekämpfungsmittel Auskunft. **Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst), Blumenkulturen und Grünpflanzen, Rosen:** 0.1 -0.5 %, zur *Hemmung des Längenwachstums (Stauchen)*. Anwendung: Giessen. Nur für Topf- und Containerpflanzen. Bei Anwendung im Gewächshaus ist dieses vor dem Wiederbetreten gründlich zu lüften. **Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst), Blumenkulturen und Grünpflanzen, Rosen:** 0.15 -0.2 %, zur *Hemmung des Längenwachstums (Stauchen)*. Anwendung: Spritzapplikation. Bei Anwendung im Gewächshaus ist dieses vor dem Wiederbetreten gründlich zu lüften.
Wirkungsweise	Stabilan plus ist ein systemischer Wachstumsregulator. Stabilan plus beeinflusst die Gibberellin-Synthese und reduziert das Längenwachstum der Zellen. Dies führt zu kürzeren Pflanzen mit einer besseren Standfestigkeit. Stabilan plus kann auch die Chlorophyllbildung und das Wurzelwachstum fördern.

Herstellung Spritzbrühe	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die gemischten Mengen an Produkten beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen. **Mischbarkeit:** Stabilan plus ist mit unseren Herbiziden und Fungiziden mischbar. Bei Mischungen mit Wuchsstoffen ist die Menge von Stabilan plus um 30% zu reduzieren. Bei Mischung mit Dicamba-haltigen Produkten ist die Menge von Stabilan plus um 50% zu reduzieren. 3er-Mischungen von Stabilan plus + Sulfonylharnstoff + Fungizid sind zu unterlassen. **Wichtig** Nur in Getreide mit genügend Stickstoffversorgung anwenden. Abdrift auf Nachbarkulturen vermeiden. **Anwenderschutz:** Ansetzen der Spritzbrühe / Giessbrühe: Schutzhandschuhe tragen. Ausbringen der Spritzbrühe / Giessbrühe: Schutzhandschuhe tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten. Nachfolgearbeiten in behandelten Kulturen: bis 48 Stunden nach Ausbringung des Mittels Schutzhandschuhe + Schutzanzug tragen.
Nachbau	Keine Einschränkung
Einstufung	Achtung  P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. H302 + H312 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLV bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	5 lt. 10lt.
®	Registrierte Marke der Nufarm GmbH, AU

Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 08.05.23/RH/LG0722

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch