
Swirski-Mite Plus

Nützlinge

Zur biologischen Bekämpfung von jungen Larven verschiedener Thripsarten sowie Eier und Larven der Weißen Fliege.

Produkt	Swirski-Mite Plus sind Lebende Organismen (Milben) (XV Larven und Adulte) und enthält Typhlodromips swirskii. (W 7531)
Anwendungsbereich	Beerenbau, Gemüsebau, Zierpflanzenbau.
Wirkungsspektrum	Thripse, Weisse Fliegen (Mottenschildläuse).
Anwendung Beerenbau	**Erdbeere (Gewächshaus):** 0.4 Beutel/m², gegen *Thripse, Weisse Fliegen (Mottenschildläuse)*. Anwendung: Vorbeugend oder bei Befallsbeginn. Vor und während der Freilassungen ist eine sorgfältige Befallsüberwachung dringend zu empfehlen. Auch der Nützlingsbestand sollte regelmässig kontrolliert werden. Vor der Freilassung darf während einer angemessenen Frist kein nützlingsgefährdendes Produkt eingesetzt werden. Die Wirksamkeit dieses Präparates ist stark abhängig von den Anwendungsbedingungen (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit, Kultur, Substrat etc.). **1 Beutel = 250 Organismen.** Applikation im Abstand von 4 Wochen. **Himbeere (Gewächshaus):** 0.4 Beutel/m², gegen *Thripse*. Anwendung: Vorbeugend oder bei Befallsbeginn. Vor und während der Freilassungen ist eine sorgfältige Befallsüberwachung dringend zu empfehlen. Auch der Nützlingsbestand sollte regelmässig kontrolliert werden. Vor der Freilassung darf während einer angemessenen Frist kein nützlingsgefährdendes Produkt eingesetzt werden. Die Wirksamkeit dieses Präparates ist stark abhängig von den Anwendungsbedingungen (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit, Kultur, Substrat etc.). **1 Beutel = 250 Organismen.** Applikation im Abstand von 4 Wochen.

Gemüsebau **Zierpflanzenbau**	**Gemüsebau allg. (Gewächshaus):** 0.4 Beutel/m², gegen Thripse, Weisse Fliegen (Mottenschildläuse). Anwendung: Vorbeugend oder bei Befallsbeginn. Vor und während der Freilassungen ist eine sorgfältige Befallsüberwachung dringend zu empfehlen. Auch der Nützlingsbestand sollte regelmässig kontrolliert werden. Vor der Freilassung darf während einer angemessenen Frist kein nützlingsgefährdendes Produkt eingesetzt werden. Die Wirksamkeit dieses Präparates ist stark abhängig von den Anwendungsbedingungen (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit, Kultur, Substrat etc.). **1 Beutel = 250 Organismen.** Applikation im Abstand von 4 Wochen. Die Wirksamkeit dieses Präparates wurde nicht für alle Indikationen geprüft. **Nicht auf Tomaten anwenden.** **Blumenkulturen und Grünpflanzen (Gewächshaus):** 0.4 Beutel/m², gegen *Thripse, Weisse Fliegen (Mottenschildläuse).* Anwendung: Vorbeugend oder bei Befallsbeginn. Vor und während der Freilassungen ist eine sorgfältige Befallsüberwachung dringend zu empfehlen. Auch der Nützlingsbestand sollte regelmässig kontrolliert werden. Vor der Freilassung darf während einer angemessenen Frist kein nützlingsgefährdendes Produkt eingesetzt werden. Die Wirksamkeit dieses Präparates ist stark abhängig von den Anwendungsbedingungen (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit, Kultur, Substrat etc.). **1 Beutel = 250 Organismen.** Applikation im Abstand von 4 Wochen.
Wirkungsweise	Die Raubmilben vermehren sich im Beutel und verteilen sich über einen Zeitraum von mehreren Wochen in der Kultur. Sie stechen die Beute mit ihren Mundwerkzeugen an und saugen sie aus.
Ausbringung von Nützlingen	• Tüten an geschützten Stellen zwischen den Pflanzen aufhängen, die nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind • Die Tüten verfügen bereits über einen Ausgang • Die Verpackungen nur oben am Papprand anfassen, damit die Raubmilben keinen Schaden nehmen Die Dosierung von Swirski-Mite Plus ist abhängig von Klima, Kultur und Schädlingsdichte und sollte immer der jeweiligen Situation angepasst werden. Präventiv ausbringen oder sobald die ersten Schadmilben an der Kultur festgestellt werden Mindestens 4.000 Tüten pro Hektar verwenden und diese in gleichmäßigen Abständen zwischen den Pflanzen aufhängen Die Ausbringung sollte nach 4 Wochen wiederholt werden, falls die Bekämpfung nicht erfolgreich war. Lassen Sie sich bezüglich der optimalen

	Anwendungsstrategie für Ihre Kultur von Ihrem-Berater oder einem anerkannten Fachhändler für Koppert-Produkte beraten. **Umgebungsbedingungen** Typhlodromips swirskii ist bei Temperaturen zwischen 20 und 32 °C (68 und 90 °F) am wirksamsten. Nicht wirksam bei Temperaturen unter 18 °C (64 °F). A. swirskii ist empfindlich gegenüber einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 60 %.
Handhabung	Biologische Nützlinge leben nur sehr kurz und müssen daher möglichst schnell nach der Lieferung in der Kultur eingesetzt werden. Eine längere Lagerzeit kann die Qualität beeinträchtigen. Falls Sie Swirski-Mite Plus lagern müssen, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen. Koppert B.V. haftet nicht für Qualitätseinbußen, wenn das Produkt länger als empfohlen und/oder unter falschen Bedingungen gelagert wurde. • Haltbarkeit: 1-2 Tage • Aufbewahrungstemperatur: 12-14 °C • Im Dunkeln lagern • Auf ausreichende Belüftung achten (CO2-Anstieg)
Einstufung	 Wenn Sie ein Verblasgerät benutzen, vermeiden Sie direkten Kontakt und stellen Sie sicher, dass sich niemand in dem direkten Luftstrom des Gerätes befindet. SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLV und FIBL bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	Packungsgrösse: 100; 500 Tüten. Jede Tüte enthält 250 Raubmilben und Futtermilben. Verpackungseinheit: Tüten im Pappkarton. Trägermaterial: Kleie.
®	
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Leu+Gygax AG

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch