Mécanisme d'action

La matière active Lambda-Cyhalothrine agit rapidement aussi par des températures froides avec une largeur d'action grande.
Une bonne mouillabilité doit être assurée. Important: ne pas appliquer pendant le vol des abeilles.

Bonne miscibilité avec nos fongicides.

Profil du produit

Matière active: 100 g/l Lambda-Cyhalothrine

Formulation: CS-suspension encapsuleée

Emballages: 2,5 dl et 1 l

Emploi petits fruits

	Organismes nuisibles/Utilisation	Dosage	Délai d'attente
fraise et framboise	anthonome du fraisier ou du framboisier	0.02 % / 0,2 l/ha	3 semaines
	ver des framboises	0.01 % / 0,1 l/ha	3 semaines

Emploi arboriculture

	Organismes nuisibles/Utilisation	Dosage	Délai d'attente
poirier / Nashi	psylles du poirier	0,015 % / 0,24 l/ha Application: fin de l'hiver.	

Emploi viticulture

	Organismes nuisibles/Utilisation	Dosage	Délai d'attente
vigne	scaphoideus titanus	0,01 %	

Emploi plantes ornementales

	Organismes nuisibles/Utilisation	Dosage	Délai d'attente
cultures florales et plantes vertes	cécidomyies, chenilles défoliatrices, chrysomélides, mirides, mouches blanches, noctuelles terricoles ou vers gris, pucerons du feuillage, sciarides, mouches du terreau, thips.	0,01 % / 0,1 l/ha	
buis (buxus)	pyrale du buis	0,015 %	
gazon d'ornement et terrains de sport	tipules [larves]	0.03 % / 0.3 l/ha	

Renouveler l'application après 8 à 14 jours en cas de forte attaque du ravageur.

Leu+Gygax SA



Emploi cultures maraîchères

	Organismes nuisibles/Utilisation	Dosage	Délai d'attente
aubergine, concombre, coqueret du Pérou, courges, courges à peau comestible, melons, pastèque, poire melon, poivron, tomate	mouches mineuses, noctuelles terricoles ou vers gris, pucerons du feuillage, thrips	0,01% / 0,1 l/ha	3 jours
artichaut, cardon, courges oléagineuses, crosnes du japon, maïs sucré, scorsonère, topinambur	mouches mineuses, noctuelles terricoles gris, pucerons du feuillage, thrips	0,1 l/ha	2 semaines
ail, échalote, oignon, poireau	mouches mineuses, noctuelles terricoles ou vers gris, pucerons du feuillage, teigne du poireau, thrips	0,1 l/ha	2 semaines
asperge	criocère à douze points de l'asperge, mouches mineuses, nocutelles terrioles ou vers gris, pucerons du feuillage, thrips	0,1 l/ha Application: après la récolte.	
baby-Leaf (Asteraceae)	mouches mineuses, noctuelles terricoles ou vers gris, pucerons du feuillage, thrips	0,1 l/ha	1 Woche
baby-Leaf (Brassicaceae)	altises, mouches mineuses, noctuelles terri coles ou vers gris, pucerons du feuillage, thripse	0,1 l/ha	1 Woche
baby-Leaf (Cheropodioaceae)	altises, mouches mineuses, noctuelles terri coles ou vers gris, pucerons du feuillage, thripse	0,1 l/ha	1 Woche
bette, betterave à salade, épinard	altises, moches mineuses, noctuelles terricoles ou vers gris, pucerons du feuillage, thrips	0,1l/ha	2 semaines
carotte, céleri, fenouil bulbeux, panais, persil à grosse racine	mouche de la carotte, mouches, mineuses, noctuelles terricoles ou vers gris, psylle de la carotte, pucerons du feuillage, thrips	0,1 l/ha	2 semaines
chicorée witloof (chicorée-endive)	mouches mineuses, noctuelles terricoles ou vers gris, pucerons du feuillage, thrips	0,1 l/ha	
cresson de jardin	altises, mouches mineuses, noctuelles terricoles ou vers gris, pucerons du feuillage, thrips	0,1 l/ha	1 semaine
choux	altises, cécidomyie du chou, mouches blanches mouches mineuses, noctuelles (défoliatrices) noctuelles terricoles ou vers gris, peridae, pucerons du feuillage, teigne des crucifères (Plutella xylostella) thrips	0,1 l/ha	2 semaines
crima di rapa, navet à tondre, roquette, salades Asia (Brassicaceae)	altises, mouches mineuses, noctuelles terricoles ou vers gris, pucerons du feuillage, thrips	0,1 l/ha	1 semaine
fève, haricots, pois	mouches mineuses, noctuelles terricoles ou vers gris, pucerons du feuillage, thrips, tordeuse du pois	0,1 l/ha	1 semaine
fines herbes	altises, mouches mineuses, noctuelles terricoles ou vers gris, psylle de la carotte, pucerons de la carotte, pucerons du feuillage, teigne du poireau, thrips	0,1 l/ha	1 semaine
mâche, rampon	mouches mineuses, noctuelles terricoles ou vers gris, pucerons du feuillage, thrips	0,1 l/ha	3 semaines
radis de tous le mois, radis long, raifort, rave de Brassica rapa et B. napus	altises, mouches mineuses, noctuelles terricoles ou vers gris, pucerons du feuillage, thrips	0,1 l/ha	2 semaines
rhubarbe	altises, mouches mineuses, noctuelles terricoles ou vers gris, pucerons du feuillage, thrips	0,1 l/ha	2 semaines
salades (Asteraceae)	mouches mineuses, noctuelles terricoles ou vers gris, pucerons du feuillage, thrips	0,1 l/ha	1 semaine



Emploi grandes cultures

	Organismes nuisibles/Utilisation	Dosage	Délai d'attente
betterave à sucre, betterave fourragère	altises de la betterave, noctuelles terricoles ou vers gris,	0,075 l/ha	6 semaines
	teigne de la betterave	0,0625 l/ha	7 jours
carthame, colza, féverole, graminées pour la production de semences, houblon, lin, lupin, maïs, riz semis sur terrain sec, soja, sorgho commun, tournesol, trèfles pour la production de semences	noctuelles terricoles ou vers gris	0,075 l/ha	6 semaines
céréales	chlorops, noctuelles terricoles ou vers gris	0,075 l/ha	6 semaines
colza	charançon des siliques Effet partiel: cécidomyie des siliques du colza	0,075 l/ha Application: jusqu'au stade fin développement des boutons floraux (BBCH 59).	6 semaines
	gros charançon de la tige du colza	0,1 l/ha Application: stade 31-53 (BBCH).	6 semaines
colza	altise d'hiver du colza, tenthrède de la rave	0,075 l/ha Application: en automne.	6 semaines
houblon	pucerons du feuillage	0,0075 % Application: dès le stade BBCH 37.	3 semaines
pois protéagineux	noctuelles terricoles ou vers gris, tordeuse du pois	0,075 l/ha	
pomme de terre pour la production de plants	pucerons vecteurs de virus	0,075 l/ha	
pomme de terre	doryphore, noctulles terricoles ou vers gris	0,075 l/ha	3 semaines
tabac	noctuelles terricoles ou vers gris	0,075 l/ha	

Préparation de la bouillie

Le volume de 400 L/ha d'eau ou plus est généralement plus sûr que 200 L (pour un humectage de la face inférieure des feuilles). Les choix portant sur la répartition du dépôt (type de buse, pression) sont importants pour une pulvérisation régulière.
Bien agiter Techno 10 CS avant utilisation et verser dans la cuve du pulvérisateur avec l'agitateur en marche. Maintenir l'agitateur en action pendant le remplissage et l'épandage.



Leu+Gygax SA

5413 Birmenstorf AG, Téléphone 056 201 45 45

www.leugygax.ch / info@leugygax.ch

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Techno 10 CS

L'insecticide polyvalent contre les insectes dévoreurs et suceurs



- **Techno 10 CS est une Pyréthrinoïde de haute efficacité avec un faible dosage**
- **Techno 10 CS agit par contact et ingestion et montre une bonne tolérance dans les cultures (feuilles, fleurs)**
- **Action rapide aussi avec des températures basses**
- **Techno est néfaste pour les abeilles et doit donc être utilisé en dehors du vol des abeilles**

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45

www.leugygax.ch

Leu+Gygax SA