Techno™ 10 CS

Insetticida

Insetticida a largo spettro d'azione in frutticoltura, orticoltura, campicoltura, piante a bacche e piante ornamentali.

Prodotto	Techno 10 CS è una sospensione di capsule (CS) e contiene 9.53 % 100 g/l Lambda-Cialotrina.
Colture	Campicoltura, Coltivazione di bacche, Frutticoltura, Orticoltura, Viticoltura, Coltivazione piante ornamentali.
Spettro di efficacia	Afidi, Afidi vettori di virus, Aleurodidi, Altica della colza, Altiche, Altiche della barbabietola, Antonomo delle fragole o dei lamponi, Cavolaie, Cecidomia del cavolo, Cecidomia delle silique delle crocifere, Cecidomie, Cloropo del grano, Criocera a dodici punti, Crisomelidi, Dorifora della patata, Minatrici, Miridi, Mosca della carota, Nottue (defogliatrici), Nottue terricole o vermi grigi, Piralide del bosso, Psilla della carota, Psille del pero, Punteruolo degli steli della colza, Punteruolo delle silique delle crocifere, Scafoideo, Sciaridi, Sitone del pisello, Tentredine delle crocifere, Tignola del porro, tignola della barbabietola, Tignola delle Crocifere, Tipulidi [Larve], Tortrice del pisello, Tripidi, Verme del lampone.
Applicazione Coltivazione di bacche	**Fragola:** 0.02% (0.2 lt/ha), contro *Antonomo delle fragole o dei lamponi, Tripid*. Termine d'attesa: 3 settimane. La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.

Frutticoltura	**Lampone:** 0.02% (0.2 lt/ha), contro *Antonomo delle fragole o dei lamponi*. Termine d'attesa: 3 settimane. Per i lamponi estivi la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. Per i lamponi autunnali la dose si riferisce ad una siepe di 150 - 170 cm d'altezza, trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 L/ha. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Lampone:** 0.01% (0.1 lt/ha), contro *Verme del lampone*. Termine d'attesa: 3 settimane. Per i lamponi estivi la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 L/ha. Per i lamponi autunnali la dose si riferisce ad una siepe di 150 - 170 cm d'altezza, trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 L/ha. per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Pero/Nashi:** 0.015% (0.24 lt/ha), contro *Psille del pero*. Applicazione: Inverno inoltrato. La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 100 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api.

Viticoltura	Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Viti:** 0.01%, contro *Scafoideo*. Trattamento soltanto su indicazione dei servizi fitosanitari cantonali. 2 - 3 trattamenti a intervalli di 14 giorni. Solamente trattamento di portainnesti in vivai. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori.
Orticoltura	**Aglio, Cipolle, Porro, Scalogni:** 0.1 lt/ha, contro *Afidi, Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tignola del porro, Tripidi*. Termine d'attesa: 2 settimane. Al massimo 3 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Trattamenti a intervalli di 7-14 giorni. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Alchechengio, Angurie, Cetrioli, Melanzana, Meloni, Peperone, Pepino, Pomodori, Zucche (buccia non commestibile), Zucche con buccia commestibile:** 0.01% (0.1lt/ha), contro *Afidi, Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tignola del porro, Tripidi*. Termine d'attesa: 3 giorni. Trattamenti a intervalli di 7-14 giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo

	delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Asparagi:** 0.1 lt/ha, contro *Afidi, Criocera a dodici punti, Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi*. Applicazione: dopo il raccolto. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Baby-Leaf (Asteraceae):** 0.1 lt/ha, contro *Afidi, Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi*. Termine d'attesa: una settimana. Al massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Baby-Leaf (Brassicaceae):** 0.1 lt/ha, contro *Afidi, Altiche, Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi*. Termine d'attesa: una settimana. Al massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori.

	Baby-Leaf (Chenopodiaceae): 0.1 lt/ha, contro *Afidi, Altiche, Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi*. Termine d'attesa: una settimana. Al massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Barbabietola, Bietola, Spinaci:** 0.1 lt/ha, contro *Afidi, Altiche, Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi*. Termine d'attesa: una settimana. Al massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Carciofi, Cardo, Mais dolce, Scorzonera, Topinambur, Tuberina, Zucca da olio:** 0.1 lt/ha, contro *Afidi, Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi*. Termine d'attesa: 2 settimane. Al massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori.

	Carote, Finocchio dolce, Pastinaca, Prezzemolo tuberoso, Sedano da coste, Sedano rapa: 0.1 lt/ha, contro *Afidi, Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Psilla della carota, Tripidi*. Termine d'attesa: 2 settimane. Al massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Carote, Finocchio dolce, Pastinaca, Prezzemolo tuberoso, Sedano da coste, Sedano rapa:** 0.1 lt/ha, contro *Mosca della carota*. Termine d'attesa: 2 settimane. Trattamenti solo durante il volo (secondo numero critico delle catture) a intervalli di almeno 7 giorni. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Cavoli / rape da taglio, Cima di rapa, Insalate asiatiche (Brassicacee), Rucola:** 0.1 lt/ha, contro *Afidi, Altiche, Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi*. Termine d'attesa: una settimana. Trattamenti a intervalli di 7-14 giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori.

	Cicoria belga: 0.1 lt/ha, contro *Afidi, Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi*. Trattamenti a intervalli di 7-14 giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Crescione:** 0.1 lt/ha, contro *Afidi, Altiche, Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi*. Termine d'attesa: una settimana. Al massimo un trattamento per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Erbette da cucina:** 0.1 lt/ha, contro *Afidi, Altiche, Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Psilla della carota, Tignola del porro, Tripidi*. Termine d'attesa: una settimana. Trattamenti a intervalli di 7-14 giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Fagioli, Fave, Piselli:** 0.1 lt/ha, contro *Afidi, Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Sitone del pisello, Tripidi*. Termine

	d'attesa: una settimana. Trattamenti a intervalli di 7-14 giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Insalate (Asteracee):** 0.1 lt/ha, contro *Afidi, Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi*. Termine d'attesa: una settimana. Trattamenti a intervalli di 7-14 giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Rabarbaro:** 0.1 lt/ha, contro *Afidi, Altiche, Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi*. Applicazione: dopo il raccolto. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Rabarbaro:** 0.1 lt/ha, contro *Afidi, Altiche, Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi*. Termine d'attesa: 2 settimane. Trattamenti a intervalli di 7-14 giorni. Al massimo 2 trattamenti

	per anno e particella con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Rafano rusticana/Ramolaccio, Ramolaccio, Rapa di Brassica rapa e B. napus, Ravanello:** 0.1 lt/ha, contro *Afidi, Altiche, Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi*. Termine d'attesa: 2 settimane. Trattamenti a intervalli di 7-14 giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Specie di cavoli:** 0.1 lt/ha, contro *Afidi, Aleurodidi, Altiche, Cavolaie, Cecidomia del cavolo, Minatrici, Nottue (defogliatrici), Nottue terricole o vermi grigi, Tignola delle Crocifere, Tripidi*. Termine d'attesa: 2 settimane. Trattamenti a intervalli di 7-14 giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori.

Campicoltura	**Valerianella:** 0.1 lt/ha, contro *Afidi, Minatrici, Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi*. Termine d'attesa: 3 settimane. Trattamenti a intervalli di almeno 7 giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Barbabietole da foraggio e da zucchero:** 0.075 lt/ha, contro *Altiche della barbabietola, Nottue terricole o vermi grigi*. Termine d'attesa: 6 settimane. Al massimo un trattamento per coltura. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Barbabietole da foraggio e da zucchero:** 0.075 lt/ha, contro *tignola della barbabietola*. Termine d'attesa: 7 giorni. Al massimo un trattamento per coltura. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor uso). Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Cartamo, Colza, Fava, Girasole, Graminacee per la produzione di sementi, Lino, Lupini, Luppolo, Mais, Riso seminato su terreno asciutto, Soia, Sorgo, Trifoglio per la produzione di sementi:** 0.075 lt/ha, contro *Nottue terricole o vermi grigi*. Termine d'attesa: 6 settimane. Al massimo un trattamento per coltura e anno. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può

	essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Cereali:** 0.075 lt/ha, contro *Cloropo del grano, Nottue terricole o vermi grigi*. Termine d'attesa: 6 settimane. Al massimo un trattamento per coltura. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Colza:** 0.075 lt/ha, contro *Altica della colza, Tentredine delle crocifere*. Termine d'attesa: 6 settimane. Applicazione: in autunno. Al massimo un trattamento per coltura e anno. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Colza:** 0.075 lt/ha, contro *Punteruolo delle silique delle crocifere.* Azione parziale: *Cecidomia delle silique delle crocifere*. Termine d'attesa: 6 settimane. Applicazione: fino allo stadio fine sviluppo dei bottoni fiorali (BBCH 59). Al massimo un trattamento per coltura e anno. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Colza:** 0.1 lt/ha, contro *Punteruolo degli steli della colza*. Termine d'attesa: 6 settimane. Applicazione: stadi 31-53 (BBCH). Al massimo un trattamento per coltura e anno. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare

	una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Luppolo:** 0.0075%, contro *Afidi*. Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: dallo stadio BBCH 37. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. **Patate:** 0.075 lt/ha, contro *Punteruolo degli steli della colza*. Termine d'attesa: 3 settimane. Per evitare l'insorgere di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti un piretroide per più di una volta per coltura. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Patate:** 0.075 lt/ha, contro *Nottue terricole o vermi grigi*. Termine d'attesa: 3 settimane. Al massimo un trattamento per coltura. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Patate per la produzione di tuberi-seme:** 0.075 lt/ha, contro *Afidi vettori di virus*. Solamente per colture in tunnel o in serra. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.

Coltivazione piante ornamentali	**Pisello proteico:** 0.075 lt/ha, contro *Nottue terricole o vermi grigi, Tortrice del pisello.* Al massimo un trattamento per coltura. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Tabacco:** 0.075 lt/ha, contro *Nottue terricole o vermi grigi*. Al massimo un trattamento per coltura. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Bosso (Buxus):** 0.015%, contro *Piralide del bosso*. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor uso). **Colture da fiore e piante verdi:** 0.01% (0.1 lt/ha), contro *Afidi, Aleurodidi, Cecidomie, Crisomelidi, Miridi, Nottue terricole o vermi grigi, Sciaridi, Tripidi*. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori.

	Tappeti erbosi e terreni sportivi: 0.03% (0.3 lt/ha), contro *Tipulidi [Larve]*. Se necessario ripetere l'applicazione dopo 7 giorni. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
Modalità di azione	La materia attiva lambda-cyhalothrina è un insetticida non sistemico di contatto e agisce attraverso lo stomaco, che possiede proprietà repellenti. L'insetticida lambda-cyhalothrina presenta una azione di distruzione/sterminazione rapida e continua, ed un azione prolungata.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** secondo la guida. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H302 Nocivo se ingerito. H332 Nocivo se inalato. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.

Imballaggio	250 ml. 1 lt.
®	
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni indicate.

Version 08.02.21/RH/RF/LG1120

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Telefono 031 839 24 41
www.leugygax.ch