Temsa SC

Mesotrione



- **Nachauflauf-Herbizid zur Bekämpfung von zweikeimblättrigen Unkräutern (Amarant, Gänsefuss-Arten etc.)**
- **gute Mischbarkeit mit Equip und Frontier X2**
- **nachhaltige Wirkung bei Gräser und Unkräuter**

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax AG

Wirkungsspektrum

Gute bis ausreichende Wirkung:
Hühnerhirse*, Fingerhirse-Arten*, Gabelblütige Hirse*, Haarstiehlhirse*, Echte Rispenhirse*, Sudangras*. Amarant-Arten**, Einjähriges Bingelkraut**, Ehrenpreis-Arten, Franzosenkraut-Arten, Gänsefuss-Arten, Acker-Hellerkraut, Hirtentäschelkraut, Acker-Hohlzahn, Ackerhundskamille, Gemeine Hundspetersilie, Kamille-Arten**, Kletten-Labkraut (bis 1. Quirl), Ampfer-Knöterich, Vogel-Knöterich, Winden-Knöterich**, Acker-Kratzdistel (Sämlinge), Gemeine Melde**, Samtpappel, Schwarzer Nachtschatten, Acker-Senf, Acker-Spörgel, Gemeiner Stechapfel, Vogel-Sternmiere, Acker-Stiefmütterchen**, Purpurrote Taubnessel, Grosser Wegerich, Weissklee.

* bis zum 3-Blatt-Stadium,
** bis zum 2-4 Blatt-Stadium.

Bei günstigen Bedingungen ausreichend erfasst werden:
Gänsedistel-Arten, Kamille, Klebern, Kreuzkraut, Ambrosia, Ausfallgetreide, Bingelkraut, Vergissmeinnicht, Landwasser-Knöterich, Acker-Kratzdistel (ausdauernde Pflanzen), Acker-Schachtelhalm, Acker-Winde, Zaun-Winde, Ausfallkartoffeln.



Produkteprofil

Formulierung: SC - Suspensionskonzentrat

Wirkstoff: Mesotrione 9.2% (100 g/l)

GHS-Einstufung:

Gefahr



GHS 05 GHS 07 GHS 09

Wirkungsweise

Mesotrione ist ein Herbizid aus der chemischen Gruppe der Triketone und wirkt überwiegend im Nachauflauf über das Blatt, teilweise auch über Boden und Wurzel. Temsa SC hemmt die Keimung der Unkräuter im Boden und kontrolliert unter feuchten Bedingungen so später auflaufende Unkräuter. Der Wirkstoff hemmt indirekt die Carotinoid-Biosynthese, was in der Pflanze zur Zerstörung des Chlorophylls (Blattgrün) führt. Behandelte Pflanzen reagieren mit typischer Weissverfärbung der Blätter. Die ersten Symptome sind ca. 5 bis 7 Tage nach der Behandlung sichtbar, der Absterbeprozess dauert ca. 14 Tage. Hohe Lichtintensität und wüchsige Bedingungen begünstigen die Wirkung.

Mischbarkeit

Temsa SC kann mit unseren Pflanzenschutzmitteln kombiniert werden.

Anwendung

Mais: 0.5 - 1.5 l/ha gegen *Dicotyledonen (Unkräuter), Monocotyledonen (Ungräser),* Faible dose d'application uniquement en mélange en cuve selon les indications du titulaire de l'autorisation.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikette und Produkteinformationen lesen.

Leu+Gygax AG

5413 Birmenstorf AG, Telefon 056 201 45 45

www.leugygax.ch / info@leugygax.ch