Temsa SC

Mésotrione



- **Herbicide de post-levée pour lutter contre les dicotylédones (amarante, chénopodes, etc.)**
- **bonne miscibilité avec Equip et Frontier X2**
- **effet durable sur les graminées et les mauvaises herbes**

5413 Birmenstorf, Tél. 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax SA

Spectre d'efficacité

Efficacité bonne à suffisante:
panic pied-de-coq*, digitaire sanguine*, panic à fleurs dichotomes*, panicum capillaire*, millet commun*, sorgho du soudan*, amarante **, mercuriale annuelle**, véronique commune, galinsoga à petites fleurs, chénopodes, tabouret des champs, capselle bourse-à-pasteur, ortie royale, matricaire inodore, petite ciguë, matricaire camomille**, gaillet gratteron (jusqu'à 1 verticille), renouée à feuilles d'oseille, renouée des oiseaux, renouée faux liseron**, chardon des champs (plantule), arroche étalée**, abutilon, morelle noire, moutarde des champs, spergule des champs, datura officinal, mouron des oiseaux, pensée des champs**, lamier pourpre, grand plantain, sortes de trèfles.

* jusqu'au stade 3 feuilles,
** jusqu'au stade 2-4 feuilles.

Efficacité éprouvée dans des conditions favorables:
laiteron des champs, matricaire camomille, gaillet gratteron, séneçon commun, ambroisie, repousses de céréales, mercuriale annuelle, myosotis des champs, renouées, chardon des champs (plantes vivaces), prêle, liserons, repousses de pommes de terre.



Profil du produit

Formulation: SC - Suspension concentrée

Matière active: Mésotrione 9.2% (100 g/l)

Classification GHE: Danger



GHS 05 GHS 07 GHS 09

Mode d'action

La Mésotrione fait partie du groupe chimique des tricétones et est utilisée principalement en post-levée car son action est principalement foliaire, un moindre effet résiduaire lui est aussi attribuée principalement racinaire. Temsa SC inhibe la germination des mauvaises herbes dans le sol et contrôle les mauvaises herbes qui émergent plus tard dans des conditions humides. L'ingrédient actif inhibe indirectement la biosynthèse des caroténoïdes, ce qui conduit à la destruction de la chlorophylle (vert des feuilles) dans la plante. Les plantes traitées réagissent avec le blanchiment typique des feuilles. Les premiers symptômes sont visibles environ 5 à 7 jours après le traitement, le processus de mort prend environ 14 jours. Une intensité lumineuse élevée et des conditions favorables de croissance favorisent l'effet.

Miscibilité

Temsa SC peut être combiné avec nos produits phytosanitaires.

Application

Maïs: 0.5 - 1.5 l/ha contre *Dicotylédonen, monocotyledonen,* Faible dose d'application uniquement en mélange en cuve selon les indications du titulaire de l'autorisation.

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Leu+Gygax SA
5413 Birmenstorf AG, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch / info@leugygax.ch