# Temsa SC

**erbicida**

## Erbicida di post-emergenza contro il miglio e altre infestanti nel mais.

| | |
|---|---|
| **Prodotto** | Temsa SC è uno sospensione concentrata (SC) e contiene 9.2 % (100 g/l) Mesotrione, Coformulante da dichiarare separatamente: Alcohols, C12-15, ethoxylated. (W-7041) |
| **Culture** | Campicoltura (F) |
| **Spettro di efficacia** | Efficacia da buona a sufficiente: giavone piede di gallo*, sanguinella*, panico delle risaie*, Giavone comune *, miglio *, sorghetta da seme *, amaranto **, mercorella comune **, veronica comune, galinsoga comune, farinello, erba storna comune, borsa del pastore, canapetta comune, camomilla selvatica, cicuta aglina, camomilla comune **, attaccamano, persicaria maggiore, correggiola, correggiola **, cardo (Piantine), atriplice erba corregiola **, cencio molle, erba morella, Sinapis arvensis, Spergula arvensis, stramonio, centocchio, viola **, falsa ortica, piantaggine, Trifoglio bianco. * fino allo stadio di 3 foglie, ** fino allo stadio di 2-4 foglie. Efficacia comprovata in condizioni favorevoli: grespino dei campi, camomilla comune, attaccamano, senecione comune, Ambrosia con foglie di artemisia, Ricacci di cereali, mercorella comune, non ti scordar di me minore, poligono, cardo campestre (piante perenni), equiseto, vilucchione, Ricacci di Patate.<br><br>Efficienza insufficiente; coda di volpe comune, avena selvatica, pabbio, geranio a foglie divise, Bromo del prati, Becco di Gru Zicutario, pabbio, loietto italico, cappellini dei campi, stregona annuale, Papaver rhoeas, gramigna comune, loietto perenne, Pennacchini, Romice. |
| **Applicazione Campicoltura (F),** | **Mais:** 0.5 - 1 lt/ha, contro *Dicotiledoni (malerbe) Monocotiledoni (malerbe)*. Bassa dose d'applicazione utilizzabile unicamente in una miscela. Nessun trattamento, in presenza di persone non protette che potrebbero essere esposte alla deriva. Per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta |

| | |
|---|---|
| | attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Informazione affinché terze persone non entrino nella particella. |
| **Modalità di azione** | La Mésotrione fait partie du groupe chimique des tricétones et est utilisée principalement en post levée car son action est principalement foliaire, un moindre effet résiduaire lui est aussi attribuée principalement racinaire. Temsa SC inhibe la germination des mauvaises herbes dans le sol et contrôle les mauvaises herbes qui émergent plus tard dans des conditions humides. L'ingrédient actif inhibe indirectement la biosynthèse des caroténoïdes, ce qui conduit à la destruction de la chlorophylle (vert des feuilles) dans la plante. Les plantes traitées réagissent avec le blanchiment typique des feuilles. Les premiers symptômes sont visibles environ 5 à 7 jours après le traitement, le processus de mort prend environ 14 jours. Une intensité lumineuse élevée et des conditions favorables de croissance favorisent l'effet. |
| **Preparazione del porridge** | Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità, miscelate i prodotti, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione.<br>**Miscibilità:** In caso di utilizzo in combinazione con altri prodotti, seguire sempre le istruzioni riportate sull'etichetta dei prodotti partner.<br>**Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi). |
| **Rotazione delle colture** | Nessuna restrizione, dopo una normale stagione di crescita. |
| **Classificazione** | Pericolo<br><br>P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.<br>EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le |

# Scheda Tecnica

| | |
|---|---|
| | istruzioni per l'uso.<br>H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.<br>H318 Provoca gravi lesioni oculari.<br>H361d Sospettato di nuocere al feto.<br>H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.<br>SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. |
| **Comportamento nell'ambiente** | Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate. |
| **imballaggio** | 5 lt |
| ® | |
| **Da notare** | Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza. |

Version 03.03.25/RH/RF/LG0000

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch