
Thripex

Nützlinge

Zur biologischen Bekämpfung verschiedener Thripsarten (Eier und erstes Larvenstadium), Spinnmilben.

Produkt	Thripex sind Lebende Organismen (Milben) (XV Larven und Adulte) und enthält Amblyseius cucumeris (synonym: Neoseiulus cucumeris). (W 7156)
Anwendungsbereich	Gemüsebau, Zierpflanzenbau.
Wirkungsspektrum	Thripse, Teilwirkung: Spinnmilben.
Anwendung Gemüsebau	**Gemüsebau allg. (Gewächshaus):** 50-200 Organismen/m², gegen *Thripse*. Teilwirkung: *Spinnmilben*. Anwendung: Beim Auftreten der ersten Schädlinge oder Saugschäden. alle 14 Tage bestreuen. Vor und während der Freilassungen ist eine sorgfältige Befallsüberwachung dringend zu empfehlen. Auch der Nützlingsbestand sollte regelmässig kontrolliert werden. Vor der Freilassung darf während einer angemessenen Frist kein nützlingsgefährdendes Produkt eingesetzt werden. **Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst), Blumenkulturen und Grünpflanzen: Rosen. (Gewächshaus):** 50-200 Organismen/m², gegen *Thripse*. Teilwirkung: *Spinnmilben*. Anwendung: Alle 14 Tage bestreuen. Beim Auftreten der ersten Schädlinge oder Saugschäden.Vor und während der Freilassungen ist eine sorgfältige Befallsüberwachung dringend zu empfehlen. Auch der Nützlingsbestand sollte regelmässig kontrolliert werden. Vor der Freilassung darf während einer angemessenen Frist kein nützlingsgefährdendes Produkt eingesetzt werden.
Wirkungsweise	Adulte Raubmilben begeben sich aktiv auf die Suche nach Beute und saugen sie aus.
Ausbringung von Nützlingen	• Flasche vor der Ausbringung vorsichtig drehen und schütteln. • Flasche: Auf die Mitte der Kappe drücken, um das Dosierloch zu öffnen. • Eimer: Mit einem Löffel 2 - 3 ml Thripex auf den Steinwollblock gegenüber dem Tropfer verteilen.

	• Auf die Blätter streuen. • Mindestens 4.000 Ausbringungspunkte pro Hektar, die gleichmäßig über die Gesamtfläche verteilt sind. • Thripex kann bei Bedarf maschinell mit dem (Mini)-Air(o)bug ausgebracht werden. Wenn das Material häufchenweise auf Steinwollblöcken ausgestreut wird, vermehren sich die Raubmilben über mehrere Wochen und verteilen sich in der Kultur. Die Raubmilbe macht keine Diapause und kann daher das ganze Jahr über eingesetzt werden. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte mehrere Stunden am Tag über 75 % liegen und die Temperatur mehr als 20 °C betragen.
Handhabung	Biologische Nützlinge leben nur sehr kurz und müssen daher möglichst schnell nach der Lieferung in der Kultur eingesetzt werden. Eine längere Lagerzeit kann die Qualität beeinträchtigen. Falls Sie Thripex lagern müssen, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen. Koppert B.V. haftet nicht für Qualitätseinbußen, wenn das Produkt länger als empfohlen und/oder unter falschen Bedingungen gelagert wurde. • Haltbarkeit: 1-2 Tage • Aufbewahrungstemperatur: 10-15 °C (Thripex-V 8-10 °C) • Im Dunkeln lagern (horizontal) • Eimer nicht stapeln
Einstufung	 Wenn Sie ein Verblasgerät benutzen, vermeiden Sie direkten Kontakt und stellen Sie sicher, dass sich niemand in dem direkten Luftstrom des Gerätes befindet. SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW und FIBL bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	1-l-Flasche, enthält 50.000 Raubmilben und Vorratsmilben 6-l-Eimer, enthält 100.000 Raubmilben und Vorratsmilben Die Flasche bzw. der Eimer enthält Raubmilben (alle Stadien) und Vorratsmilben (alle Stadien) in Kleie.
®	

Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 11.01.22/RH/LG0000

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch