Thripex-Plus

Nützlinge

Zur biologischen Bekämpfung verschiedener Thripsarten (Eier und erstes Larvenstadium), Spinnmilben.

Produkt	Thripex-Plus sind Lebende Organismen (Milben) (XV Larven und Adulte) und enthält Amblyseius cucumeris (synonym: Neoseiulus cucumeris). (W 4423)
Anwendungsbereich	Beerenbau, Gemüsebau, Zierpflanzenbau.
Wirkungsspektrum	Thripse, Teilwirkung: Spinnmilben.
Anwendung **Beerenbau**	**Beerenbau allg. (Gewächshaus):** 50-200 Organismen/m², gegen *Thripse.* Teilwirkung: *Spinnmilben*. Anwendung:Beim Auftreten der ersten Schädlinge oder Saugschäden. In Kombination mit Orius-Raubwanzen einsetzen. Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).
Gemüsebau	**Gemüsebau allg. (Gewächshaus):** 50-200 Organismen/m², gegen *Thripse.* Teilwirkung: *Spinnmilben*. Anwendung: Beim Auftreten der ersten Schädlinge oder Saugschäden. In Kombination mit Orius-Raubwanzen einsetzen. **Küchenkräuter, Medizinalkräuter. (Gewächshaus):** 50-200 Organismen/m², gegen *Thripse.* Teilwirkung: *Spinnmilben*. Anwendung: Beim Auftreten der ersten Schädlinge oder Saugschäden. In Kombination mit Orius-Raubwanzen einsetzen.
Zierpflanzenbau	**Zierpflanzen allg. (Gewächshaus):** 50-200 Organismen/m², gegen *Thripse.* Teilwirkung: *Spinnmilben*. Anwendung: Beim Auftreten der ersten Schädlinge oder Saugschäden. In Kombination mit Orius-Raubwanzen einsetzen.
Wirkungsweise	Adulte Raubmilben begeben sich aktiv auf die Suche nach Beute und saugen sie aus.
Ausbringung von Nützlingen	• Die Tüten in der Kultur aufhängen (die Tüten verfügen bereits über einen Ausgang). • Die Tüten an geschützten Stellen zwischen den Pflanzen platzieren (kein direktes Sonnenlicht).

	• Maßnahmen zur Förderung des Feuchtigkeitshaushalts in den Tüten (wie beispielsweise die Tüte so platzieren, dass der untere Teil auf feuchtem Substrat liegt) wirken sich positiv auf die Lebensdauer des Tüteninhalts aus. • Tüten nur oben am Papprand anfassen, damit die Raubmilben keinen Schaden nehmen. Bitte beachten Sie, dass Thripex-Plus Vorratsmilben und Kleie enthält. Diese Milben können in einigen Kulturen leichte Schäden verursachen, vor allem unter feuchten Anbaubedingungen und beim Einsatz von großen Mengen. Fragen Sie sich daher vor dem Einsatz von Thripex Ihren Berater. Es empfiehlt sich, vorab eine Probeausbringung in kleinem Maßstab vorzunehmen, um die Auswirkungen zu beobachten. Die Raubmilbe macht keine Diapause und kann daher das ganze Jahr über eingesetzt werden. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte mehrere Stunden am Tag über 75 % liegen und die Temperatur mehr als 20 °C betragen.
Handhabung	Biologische Nützlinge leben nur sehr kurz und müssen daher möglichst schnell nach der Lieferung in der Kultur eingesetzt werden. Eine längere Lagerzeit kann die Qualität beeinträchtigen. Falls Sie Thripex-Plus lagern müssen, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen. Koppert B.V. haftet nicht für Qualitätseinbußen, wenn das Produkt länger als empfohlen und/oder unter falschen Bedingungen gelagert wurde. • Haltbarkeit: 1-2 Tage • Aufbewahrungstemperatur: 10-15 °C
Einstufung	SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW und FIBL bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	500 Tüten pro Schachtel Jede Papiertüte mit Aufhänger enthält 1.000 Raubmilben und Futtermilben (alle Stadien) in Kleie.
®	
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 03.12.21/RH/LG0000

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch