# Thripor-L

**Nützlinge**

## Zur biologischen Bekämpfung verschiedener Thripsarten (Larven und Vollinsekten).

| | |
|---|---|
| **Produkt** | Thripor-L sind Lebende Organismen (Insekten) (XV Larven und Adulte) und enthält Orius laevigatus. (W 5526) |
| **Anwendungsbereich** | Beerenbau, Gemüsebau, Zierpflanzenbau. |
| **Wirkungsspektrum** | Thripse, Kalifornischer Blütenthrips, Zwiebelthrips. Teilwirkung: Spinnmilben. |
| **Anwendung Beerenbau** | **Brombeere, Heidelbeere, Himbeere, Rote Johannisbeere, Schwarze Johannisbeere, Stachelbeere. (Gewächshaus):** 0.5-5 Organismen/m², gegen *Thripse*. Teilwirkung: *Spinnmilben*. Anwendung: Beim Auftreten der ersten Schädlinge oder Saugschäden. Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use). |
| **Gemüsebau** | **Gemüsebau allg. (Gewächshaus):** 0.5-5 Organismen/m², gegen *Kalifornischer Blütenthrips, Zwiebelthrips*. Anwendung: Beim Auftreten der ersten Schädlinge oder Saugschäden. |
| **Zierpflanzenbau** | **Zierpflanzen allg. (Gewächshaus):** 0.5-5 Organismen/m², gegen *Kalifornischer Blütenthrips, Zwiebelthrips*. Anwendung:Beim Auftreten der ersten Schädlinge oder Saugschäden. |
| **Wirkungsweise** | Adulte und Nymphen stechen die Larven und Vollinsekten der Thripse mit ihren Mundwerkzeugen an und saugen sie aus. |
| **Ausbringung von Nützlingen** | • Flasche vor der Anwendung vorsichtig schütteln.<br>• Auf saubere Steinwollplatten bzw. Blätter streuen und/oder in Dosierbehältern (Dibox) verteilen.<br>• In Gruppen von 75 - 100 Insekten ausbringen, um eine Population zu etablieren und die Paarung zu fördern. Auf diese Weise ist eine Kontrolle der Reproduktion möglich.<br>• Achten Sie darauf, dass das Material am Ausbringungsort mehrere Tage ungestört bleibt.<br>• Das Abziehetikett kann zur Kennzeichnung der Ausbringungsstellen verwendet werden. |

| | |
|---|---|
| | Orius legt einen großen Teil seiner Eier in (Seiten-) Trieben ab. Um einen Verlust von Eiern durch Kulturmaßnahmen zu verhindern, sollte Orius direkt nach dem Entfernen der Seitentriebe ausgebracht werden. |
| **Handhabung** | Biologische Nützlinge leben nur sehr kurz und müssen daher möglichst schnell nach der Lieferung in der Kultur eingesetzt werden. Eine längere Lagerzeit kann die Qualität beeinträchtigen. Koppert B.V. haftet nicht für Qualitätseinbußen, wenn das Produkt länger als empfohlen und/oder unter falschen Bedingungen gelagert wurde.<br><br>• Haltbarkeit: 1-2 Tage<br>• Aufbewahrungstemperatur: 8-10 °C<br>• Im Dunkeln lagern (horizontal) |
| **Einstufung** | SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. |
| **Umweltverhalten** | Das Produkt ist vom BLW und FIBL bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten. |
| **Verpackung** | 100 -ml-Flasche, enthält 500 Vollinsekten und Nymphen<br>100 -ml-Flasche, enthält 2.000 Vollinsekten und Nymphen<br>Jede Flasche enthält Raubwanzen in Buchweizenspelzen und Vermiculit. |
| ® | |
| **Zur Beachtung** | Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen. |

Version 12.01.22/RH/LG0000

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch