Tiyati®

Biostimulant foliaire améliorant la qualité et la production du pollen ainsi que la floraison.



- ✓ **Augmente la fertilité du pollen.**
- ✓ **Améliore la floraison et protège la fleur.**
- ✓ **Optimise la photosynthèse.**
- ✓ **Améliore la qualité et le rendement de la récolte.**
- ✓ **Renforce la résistance aux stress abiotiques.**


Titane: 0.71%
Bore: 2%

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45

www.leugygax.ch

Leu+Gygax AG

Tiyati maximise la qualité du pollen et assure une fécondation optimale



Comment agit Tiyati?

1 **Tiyati** accroît la production de grains de pollen, tout en améliorant leur **vigueur**, leur **durée de vie** et leur adhérence aux stigmates. **Tiyati optimise l'assimilation, le transport et la fixation du Calcium,** ainsi que la **mise en réserve d'énergie** (glucides et lipides) améliorant ainsi la qualité et la quantité de pollen produit.

2 **Tiyati** limite les phénomènes de coulure et de millerandage. En mobilisant le calcium dans les organes reproducteurs tel que le style, il permet la germination du pollen et assure la formation optimale du tube pollinique.

3 Ainsi, en améliorant signifi cativement l'effi cacité du processus de pollinisation, **Tiyati** permet **une meilleure nouaison** et donc un **rendement plus élevé.**

Tiyati optimise la photosynthèse

Tiyati augmente la teneur en chlorophylle des feuilles, indispensable à la **photosynthèse.**

Ce gain d'énergie est nécessaire à la floraison et facilite la croissance générale de la plante, entraînant une augmentation de la biomasse et du rendement.



Tiyati améliore l'équilibre nutritionnel de la plante

Tiyati verbessert die Aufnahme von Nährstoffen aus dem Boden und verbessert dadurch die Konzentration des Zuckers in den Speicherorganen.

Tiyati améliore la qualité et le rendement de votre récolte en conditions de stress

Tiyati assure la production d'un pollen de qualité, en quantité, et un développement floral optimal.
De fait, les organes reproducteurs de la plante sont moins sensibles aux stress abiotiques et assurent un meilleur rendement.

Mode d'emploi

Arbres fruitiers: 3 applications à 0.4 l/ha aux stades bourgeons verts (BBCH 55/56), bourgeons roses ou blancs (BBCH 57/59) et floraison (BBCH 60/63). **Fraises:** 3 applications à 0.2 l/ha à partir du début de la végétation (BBCH 13/15) et jusqu'à floraison (BBCH 61), cadence 7-10 jours. **Framboises:** 4 à 5 applications à 0.2 l/ha à partir des stades début de développement des feuilles (BBCH 10-16) jusqu'à floraison (BBCH 61), cadence 7-10 jours. **Vigne:** 3 applications à 0.4 l/ha aux stades 4-6 feuilles (BBCH 14-16), boutons floraux séparés (BBCH 57) et début floraison (BBCH 60/61). **Tomate, poivron, concombre:** 3 applications à 0.4 l/ha. Le premier traitement dès le stade 2-4 feuilles (BBCH 12-14). Les deux suivants en cadence de 10 jours. **Colza:** 2 applications à 0.4 l/ha aux stades élongation de la tige (BBCH 30) et floraison (BBCH 61). Un traitement supplémentaire est possible au stade 4-6 feuilles (BBCH 14-16) à l'automne. **Pois chiches:** 3 applications à 0.4 l/ha à partir des boutons floraux, cadence 15 jours. **Céréales:** fertilisation foliaire, dose : 0,4 L/ha (2 applications) ; premier traitement – début de montaison (BBCH 30) ; II traitement – sortie inflorescence (BBCH 57) à floraison. **Maïs:** fertilisation foliaire, dose : 0,4 L/ha (2-3 applications) ; premier traitement – 2 à 6 feuilles ; deuxième traitement – 7 à 10 jours après le premier traitement ; troisième traitement – 7 à 10 jours après le second traitement.

Leu+Gygax AG
www.leugygax.ch / info@leugygax.ch
5413 Birmenstorf AG, Téléphone 056 201 45 45