Tolit

erbicida

Erbicida ad ampio spettro per il controllo delle graminacee annuali e di infestanti a foglia larga nei cereali

Prodotto	Tolit è uno sospensione concentrata (SC) e contiene 58.6 % (700 g/l) Clorotoluron. (W-7448-2)
Culture	Campicoltura (F)
Spettro di efficacia	Efficienza da buona a molto buona: coda di topo* camomilla bastarda, cappellini dei campi, camomilla comune, fienarola annuale, centocchio, fienarola comune, loietto. * La coda di topo è ben controllata fino allo stadio di stadio di 2 foglie. Parzialmente efficace contro: ventaglina dei campi, colza, erba storna comune, farinello, senape / senape selvatica, canapetta comune, non ti scordar di me minore, borsa del pastore.
Applicazione Campicoltura (F),	**Frumento autunnale, Orzo autunnale, Segale autunnale, Spelta, Triticale:** 3 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe) Monocotiledoni annuali (malerbe).* Applicazione: Autunno, in pre-emergenza; in post-emergenza, stadi 11 - 13. Nelle istruzioni per l'uso far figurare l'elenco delle varietà che tollerano il prodotto. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
Modalità di azione	Il clortoluron è un derivato dell'urea (HRAC C2) e viene assorbito da foglie e radici. La sua azione è principalmente radicale. Di conseguenza, vengono controllate anche le infestanti a foglia larga e le erbe che emergono più tardi. Quando il clortoluron viene assorbito dalle radici, il principio attivo viene trasportato ai fusti e alle foglie (sistemico-acropicale). Solo una piccola parte del clortoluron viene assorbita dalle foglie; il principio attivo viene trasportato solo alle punte delle foglie. Nell'irrorazione di post-emergenza, il clortoluron viene assorbito dalle radici nel caso delle graminacee e dalle foglie nel caso delle infestanti a foglia larga, con conseguente inibizione della

	fotosintesi. È quindi importante una sufficiente umidità del terreno, in particolare
Preparazione del porridge	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità, miscelate i prodotti, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** In caso di utilizzo in combinazione con altri prodotti, seguire sempre le istruzioni riportate sull'etichetta dei prodotti partner. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione nella normale rotazione. La sottosemina non è raccomandata quando si utilizza Tolit. Per un'interruzione precoce in autunno dopo un trattamento autunnale, è possibile piantare grano autunnale (è necessario tenere conto della selettività varietale) e segale autunnale. Nel caso di un'interruzione precoce in primavera dopo un trattamento autunnale, è possibile piantare le seguenti colture: Frumento autunnale, orzo autunnale, mais e patate. Quando si piantano grano e orzo primaverili, il terreno deve essere coltivato a una profondità di almeno 20 cm.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH208 Contiene [1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on]. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H351 Sospettato di provocare il cancro. H361d Sospettato di nuocere al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
imballaggio	5 lt
®	
Da notare	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Nota Tecnica

Version 25.02.25/RH/RF/LG0000

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch