Technisches Merkblatt

Valis® F

Fungizid

Kombiniertes Fungizid mit nachhaltiger Wirkungssicherheit im Weinbau.

Produkt	Valis F ist als Wasserdispergierbares Granulat formuliert und enthält 48% (480gr/kg) Folpet und 6% (60gr/kg) Valifenalate. W-7533
Anwendungsbereich	Weinbau.
Wirkungsspektrum	Falscher Mehltau, Graufäule (Botrytis cinerea)
Anwendung Weinbau	**Reben:** 2 kg/ha (0.125%), gegen *Falschen Mehltau der Rebe*. Teilwirkung gegen *Graufäule (Botrytis cinerera)*. Anwendung: Vor und Nachblütenbehandlung bis spätestens Mitte August. Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf Stadium BBCH 71-81 (J-M, Nachblüte) und eine Referenzbrühemenge von 1600 l/ha (Berechnungsgrundlage) oder auf ein Laubwandvolumen von 4500 m³ pro ha. Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle an das Laubwandvolumen anzupassen. Zur Vermeidung einer Resistenzbildung maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus der Wirkstoffgruppe FRAC Nr. 40 (Carboxylic acid amides, CAA).Zum Schutz von Gewässerorganismen vor den Folgen von Drift eine unbehandelte Pufferzone von 20 m zu Oberflächengewässern einhalten. Diese Distanz kann beim Einsatz von driftreduzierenden Massnahmen gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle reduziert werden. **Reben:** 2 kg/ha (0.125%), gegen *Falschen Mehltau der Rebe*. Teilwirkung gegen *Graufäule (Botrytis cinerera)*. Anwendung: Vor und Nachblütenbehandlung bis spätestens Mitte August. Luftapplikation. Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf Stadium BBCH 71-81 (J-M, Nachblüte) und eine Referenzbrühemenge von 1600 l/ha (Berechnungsgrundlage) oder auf ein Laubwandvolumen von 4500 m³ pro ha. Die Aufwandmenge ist gemäss den Weisungen der Zulassungsstelle an das Laubwandvolumen anzupassen. Zur Vermeidung einer Resistenzbildung maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus der Wirkstoffgruppe FRAC Nr. 40 (Carboxylic acid amides, CAA). Zum Schutz von

	Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone von 60 m zu Oberflächengewässern einhalten.
Wirkungsweise	Valis F ist ein wasserdispergierbares Granulat mit dem translaminaren Wirkstoff Valifenalate und dem Kontaktwirkstoff Folpet. Es schützt die Pflanzen gegen Falsche Mehltaupilze, wie *Plasmopara viticola* von innen und außen. Valifenalate gehört zur Wirkstoffgruppe der Carboxylsäureamide und ist gegen *Plasmopara viticola* in allen Entwicklungsstadien wie Sporen- und Sporangienkeimung, Myzelwachstum und Sporulation wirksam. Valifenalate dringt schnell in die Blätter und den Stängel ein und verbreitet sich von der Blattoberseite zur Blattunterseite. Somit ist der Wirkstoff sowohl außen und innen aktiv und tötet Falsche Mehltaupilze in den frühen Entwicklungsstadien ab. Durch die lokalsystemischen Eigenschaften werden auch Pflanzenteile geschützt, die nicht direkt getroffen werden und es besteht ein sicherer Schutz auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen. Zusätzlich zu Valifenalate wirkt der Multisite-Wirkstoff Folpet vorbeugend auf der Pflanzenoberfläche gegen keimende Sporen.
Herstellung Spritzbrühe	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die abgemessene Menge **Produkt** beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen. **Mischbarkeit:** Valis F ist nicht Mischbar mit Kupfer Bordo.
Nachbau	Keine Einschränkung
Einstufung	Gefahr;  P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. EUH 401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. SP1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen

Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLV bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	1 kg, 5 kg,
®	Reg. Marke der Belchim Crop Protection B
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 05.02.26/RH/LG1134

Leu+Gygax AG
5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch