Valis® F

Fungicida

Fungicida combinato e durevole contro la peronospora della vite.

Prodotto	Valis® F è un granulare idrodispersibile (WG) e contiene 48 % Folpet e 6 % Valifenalate. W-7533
Colture	Viticoltura.
Spettro di efficacia	Peronospora della vite, marciume grigio (Botrytis cinerea).
Applicazione Viticoltura	**Vite:** 0.125 % (2 kg/ha), contro *Peronospora della vite.* Azione parziale: *Marciume grigio (Botrytis cinerea)*. Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 3 trattamenti per anno e particella con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC numero 40 (Carboxylic acid amides, CAA). Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Vite:** 0.125 % (2 kg/ha). **Applicazione per via aerea**, contro *Peronospora della vite.* Azione parziale: *Marciume grigio (Botrytis cinerea)*. Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto. Applicazione per via aerea. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 3 trattamenti per anno e particella con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC numero 40 (Carboxylic acid amides, CAA). Per proteggere gli organismi

	acquatici rispettare una distanza minima pari a 60 m rispetto alle acque di superficie.
Modalità di azione	Valis F, si presenta sottoforma di granuli idrodispersibili. È un fungicida combinato. Esso contiene due materie attive, il Valifenalate (translaminare) e il Folpet (contatto). Esso protegge le piante contro la peronospora (Plasmopara viticola) dall'interno e dall'esterno. Il Valifenalato appartiene al gruppo degli amidi carbammati. Esso è efficace contro la peronospora a tutti gli stadi di sviluppo. Agisce contro le spore, la crescita del micelio e la sporulazione. Il Valifenalate, è attivo all'interno della pianta e viene fissato rapidamente nella cuticola cerosa e penetra nella foglia. Applicato sulla faccia superiore, esso protegge ugualmente la faccia inferiore della foglia.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotti necessari, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** ***Valis® F non è mescolabile con la poltiglia bordolese***. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una maschera di protezione per le vie respiratorie (P3) + occhiali di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. Per lavori successivi è necessario indossare guanti e indumenti protettivi fino a 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione
Classificazione	Pericolo  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H332 Nocivo se inalato. H351 Sospettato di provocare il cancro.

	H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
imballaggio	1 kg. 5 kg.
®	Marchio registrato Belchim Crop Protection B
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Version 05.02.26/RH/RF/LG1134

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch