Vista

Insecticide

Insecticide biologique à base d'acides gras naturels pour lutter contre les insectes en cultures maraîchères, arboriculture, petits fruits et cultures ornementales.

Produit	Vista est une suspension concentrée (SC) et contient 50 % (505 g/l) Acides gras en C7-C18 [sous forme de sel de potassium].
Cultures	Arboriculture, Culture des baies, Culture maraîchère, Culture ornementale.
Spectre d'efficacité	Acariens tétranyques, Pucerons du feuillage, Mouches blanches.
Emploi **Culture des baies**	**Espèces de Ribes, Myrtille:** 2% (20 lt/ha), contre *acariens tétranyques, pucerons du feuillage*. Délai d'attente: 1 Semaine(s). Si nécessaire, répéter le traitement. Bien mouiller les plantes de tous les côtés. N'agit que par contact direct. Le dosage indiqué se réfère au stade "mise à fruits (50 - 90% des inflorescences ont des fruits visibles)"; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha. **Fraise:** 2% (20 lt/ha), contre *acariens tétranyques, pucerons du feuillage*. Délai d'attente: 1 Semaine(s). Si nécessaire, répéter le traitement. Bien mouiller les plantes de tous les côtés. N'agit que par contact direct. Le dosage indiqué se réfère au stade "pleine floraison" et "début de la coloration rouge des fruits", 4 plants par m²; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha. **Framboise:** 2% (20lt/ha), contre *acariens tétranyques, pucerons du feuillage*. Délai d'attente: 1 Semaine(s). Si nécessaire, répéter le traitement. Bien mouiller les plantes de tous les côtés. N'agit que par contact direct. Pour les framboises d'été, le dosage indiqué se réfère au stade "début de la floraison jusqu'à 50 % de fleurs ouvertes"; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha. Pour les framboises d'automne, le dosage indiqué se

	réfère aux haies d'une hauteur comprise entre 150 et 170 cm; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha. **Grand sureau, Mini-Kiwi (Kiwaï):** 2%, contre *acariens tétranyques, pucerons du feuillage*. Délai d'attente: 1 Semaine(s). Si nécessaire, répéter le traitement. Bien mouiller les plantes de tous les côtés. N'agit que par contact direct. **Mûre:** 2% (20 lt/ha), contre *acariens tétranyques, pucerons du feuillage*. Délai d'attente: 1 Semaine(s). Si nécessaire, répéter le traitement. Bien mouiller les plantes de tous les côtés. N'agit que par contact direct. Pour les mûres, le dosage indiqué se réfère au stade "début de la floraison jusqu'à 50 % de fleurs ouvertes"; traitement avec une quantité standard de bouillie de 1000 l/ha.
Arboriculture	**Arboriculture en général:** 1.25% (20 lt/ha), contre *acariens tétranyques, pucerons du feuillage*. Délai d'attente: 1 Semaine(s). Si nécessaire, répéter le traitement. Bien mouiller les plantes de tous les côtés. N'agit que par contact direct. Le dosage indiqué s'applique à un volume de haie foliaire de 10'000 m³ par ha. Quantité de bouillie: au moins 1000 l/ha pour éviter la phytotoxicité.
Culture maraîchère	**Aubergine, Concombre, Courgette, Haricots, Poivron, Tomate:** 2% (20 lt/ha), contre *mouches blanches*. Si nécessaire, répéter le traitement. Bien mouiller les plantes de tous les côtés. N'agit que par contact direct. Attention: Lors de l'élaboration de la bouillie de pulvérisation, veiller à limiter la formation de mousse et réduire si nécessaire l'intensité du brassage en conséquence. Risque de phytotoxicité en cas de dépassement de la concentration. À des températures diurnes supérieures à 25°C, appliquer le produit le soir. **Choux (plein air):** 2% (20 lt/ha), contre *mouches blanches*. Délai d'attente: 1 Semaine(s). Si nécessaire, répéter le traitement. Bien mouiller les plantes de tous les côtés. N'agit que par contact direct. **Culture maraîchère en général:** 2%, contre *acariens tétranyques, pucerons du feuillage*. Si nécessaire, répéter le traitement. Bien mouiller les plantes de tous les côtés. N'agit que par contact direct. Attention: Lors de l'élaboration de la bouillie de pulvérisation, veiller à limiter la formation de mousse et réduire si nécessaire l'intensité du brassage en conséquence. **Fines herbes:** 2% (20 lt/ha), contre *acariens tétranyques, pucerons du feuillage*. Délai d'attente: 1 Semaine(s). Si nécessaire, répéter le traitement. Bien mouiller les plantes de tous les côtés. N'agit que par contact direct.

Fiche technique

Culture ornementale	**Arbres et arbustes (hors fôret), Cultures florales et plantes vertes, Rosier:** 2%, contre *acariens tétranyques, mouches blanches, pucerons du feuillage*. Si nécessaire, répéter le traitement. Bien mouiller les plantes de tous les côtés. N'agit que par contact direct.
Mode d'action	Vista brise la tension superficielle de l'eau. Cette brisure empêchera la bouillie de perler. Grâce à cet effet, l'eau pourra entrer dans les ouvertures de respiration des ravageurs et par la même occasion les combattre. Vista est composé d'acides gras naturels et de leur sels de potasse qui sont également utilisés pour la fabrication de savons. Ce produit est 100% biodégradable. Son emploi ne comporte aucun risque s'il est employé selon les prescriptions. Vista agit sur les insectes par contact. Toute la plante, y compris le dessous des feuilles, doit être aspergée jusqu'à ce qu'elle dégoutte. Lorsque la plante est sèche, aucune efficacité résiduelle n'est à attendre.
Préparation de la bouillie	**Préparation de la bouillie:** verser le produit directement au travers du tamis dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. **Mélanges:** Attention: Lors de l'élaboration de la bouillie de pulvérisation, veiller à limiter la formation de mousse et réduire si nécessaire l'intensité du brassage en conséquence. **Protection des utilisateurs:** Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection + des lunettes de protection ou une visière.
Rotation des cultures	Pas de restriction.
Classement	Attention  Autorisé pour l'utilisation non professionnelle. P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Le produit est homologué par l'OFAG. On peut l'utiliser en PER ainsi qu'en agriculture biologique (FIBL), les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	5 lt. 20lt
®	

Fiche technique

A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 17.01.24/RH/LG0000

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Téléphone 031 839 24 41
www.leugygax.ch