XenTari® WG

Insetticida

Insetticida biologico e altamente selettivo, per lottare efficacemente contro i bruchi.

Prodotto	XenTari è un granulato idrodispersibile (WG) e contiene 54 % Bacillus thuringiensis var. aizawai [ceppo ABTS-1857 (15'000 IU/mg)]. (W-6888)
Colture	Campicoltura, Coltivazione di bacche, Coltivazione piante ornamentali, Frutticoltura, Orticoltura, Viticoltura, Selvicoltura.
Spettro di efficacia	Nottue (defogliatrici), Tignole, Falene, Tignole della vite (Eupoecilia ambiguella, Lobesia botrana), Vanessa del cardo, Piralide del mais, Tuta absoluta, Tignola del porro, Cavolaie, Nottua del cavolo, Tignola delle Crucifere, Piralide del bosso.
Applicazione Coltivazione di bacche	**Fragola:** 0.1% (1 kg/ha), contro *Nottue (defogliatrici)*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Non utilizzare in caso di temperature fredde. Soltanto contro giovani stadi larvali. La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. **Mini-Kiwi:** 0.1%, contro *Nottue (defogliatrici)*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Non utilizzare in caso di temperature fredde. Soltanto contro giovani stadi larvali. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Mirtillo:** 0.1% (1 kg/ha), contro *Nottue (defogliatrici)*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Non utilizzare in caso di temperature fredde. Soltanto contro giovani stadi larvali. La dose indicata si riferisce allo stadio "allegagione (50 - 90% delle infiorescenze hanno frutti visibili)", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Specie di ribes:** 0.1% (1 kg/ha), contro *Nottue (defogliatrici)*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Non utilizzare in caso di temperature fredde. Soltanto contro giovani stadi larvali. La dose indicata si

	riferisce allo stadio "allegagione (50 - 90% delle infiorescenze hanno frutti visibili)", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Specie di rubus:** 0.1% (1 kg/ha), contro *Nottue (defogliatrici)*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Non utilizzare in caso di temperature fredde. Soltanto contro giovani stadi larvali. Per i lamponi estivi la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. Per i lamponi autunnali la dose si riferisce ad una siepe di 150 - 170 cm d'altezza, trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per le more la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
Frutticoltura	**Ciliegio, Melo, Prugno/Susino:** 0.1% (1.6 kg/ha), contro *Tignole*. Applicazione: Prefioritura o postfioritura. Non utilizzare in caso di temperature fredde. La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. **Frutta a granelli, Frutta a nocciolo, Frutta con guscio:** 0.1% (1.6 kg/ha), contro *Falene*. Applicazione: Prefioritura o postfioritura. Non utilizzare in caso di temperature fredde. La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha.
Viticoltura	**Vite:** 0.1% (1.2 kg/ha), contro *Tignole della vite (Eupoecilia ambiguella, Lobesia botrana)*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Non utilizzare in caso di temperature fredde. Contro la seconda generazione delle tignole della vite, aggiungere 1% di zucchero. La dose indicata si riferisce ad un trattamento nella zona dei grappoli con una quantità standard di poltiglia di 1200 l/ha (base per il calcolo).
Orticoltura	**Aglio, Cavoli / rape da taglio, Crescione acquatico, Fave, Mais dolce, Pastinaca, Prezzemolo tuberoso, Rabarbaro, Rafano rusticana / Ramolaccio, Scalogni, Scorzonera, Topinambur (Pieno campo):** 1 kg/ha, contro *Nottue (defogliatrici) Vanessa del cardo*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Non utilizzare in caso di temperature fredde. Soltanto contro giovani stadi larvali. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).

	Asparagi, Barbabietola, Bietola, cetrioli per conserva, Cicoria belga, Cipollotti a mazzi, Crescione, Erbette da cucina, Finocchio dolce, Insalate asiatiche (Brassicacee), Piselli con baccello, Portulaca, Ramolaccio, Rapa di Brassica rapa e B. napus, Ravanello, Rucola, Sedano da coste, Sedano rapa, Spinaci, Valerianella, Zucche (buccia non commestibile), Zucche con buccia commestibile: 1 kg/ha, contro *Nottue (defogliatrici) Vanessa del cardo*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Non utilizzare in caso di temperature fredde. Soltanto contro giovani stadi larvali. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Baby-Leaf (Asteraceae):** 1 kg/ha, contro *Nottue (defogliatrici)*. Termine d'attesa: 3 giorni. Non utilizzare in caso di temperature fredde. Soltanto contro giovani stadi larvali. **Carciofi (Pieno campo):** 1 kg/ha, contro *Nottue (defogliatrici) Vanessa del cardo*. Termine d'attesa: 1 settimana. Non utilizzare in caso di temperature fredde. Soltanto contro giovani stadi larvali. **Cetrioli, Melanzana, Peperone:** 0.1% (1 kg/ha), contro *Nottue (defogliatrici), Vanessa del cardo*. Termine d'attesa: 3 giorni. Non utilizzare in caso di temperature fredde. Soltanto contro giovani stadi larvali. **Fagioli, Insalate (Asteraceae):** 1 kg/ha, contro *Nottue (defogliatrici)*. Termine d'attesa: 3 giorni. Non utilizzare in caso di temperature fredde. Soltanto contro giovani stadi larvali. **Meloni:** 1% (1 kg/ha), contro *Nottue (defogliatrici), Piralide del mais*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Non utilizzare in caso di temperature fredde. Soltanto contro giovani stadi larvali. **Pepino (Serra):** 1 kg/ha, contro *Nottue (defogliatrici)*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Non utilizzare in caso di temperature fredde. Soltanto contro giovani stadi larvali. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Pomodori:** 1 %, contro *Nottue (defogliatrici), Tuta absoluta*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Non utilizzare in caso di temperature fredde. Soltanto contro giovani stadi larvali. **Porro (Pieno campo):** 1 kg/ha, contro *Tignola del porro*. Termine d'attesa: 1 Settimane. Non utilizzare in caso di temperature fredde. Soltanto contro giovani stadi larvali. **Specie di cavoli (Pieno campo):** 1 kg/ha, contro *Cavolaie, Nottua del cavolo, Nottue (defogliatrici), Tignola delle Crocifere*.

Campicoltura	Termine d'attesa: 1 Settimana. Non utilizzare in caso di temperature fredde. Soltanto contro giovani stadi larvali. **Tabacco:** 1 kg/ha, contro *Nottue (defogliatrici)*. Non utilizzare in caso di temperature fredde. Soltanto contro giovani stadi larvali.
Coltivazione piante ornamentali	**Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi, Rose:** 0.1 %, contro *Nottue (defogliatrici)*. Non utilizzare in caso di temperature fredde. Soltanto contro giovani stadi larvali. **Bosso (Buxus):** 0.1 %, contro *Piralide del bosso*. Non utilizzare in caso di temperature fredde. Soltanto contro giovani stadi larvali. Quantitativo di poltiglia: 600 l/ha. Al massimo 6 trattamenti per anno e particella a intervalli di 5 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
Selvicoltura	**Vivai forestali:** 0.1 %, contro *Nottue (defogliatrici)*. Non utilizzare in caso di temperature fredde. Soltanto contro giovani stadi larvali. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
Modalità di azione	XenTari, combina la selettività della lotta biologica con una utilizzazione facile e sicura. I cristalli di proteine e le endospore del battere, sono ingerite dai bruchi nel medesimo tempo dei tessuti delle piante. Tramite la decomposizione enzimatica nell'intestino dei bruchi, i cristalli delle proteine, si trasformano in tossine, le quali si fissano sull'epitelio intestinale e lo perfora. Attraverso questi buchi, le spore invadono i bruchi e si moltiplicano. Il bruco intero è infestato causando così la sua morte. Un'ora dopo il trattamento, sintomi di paralisi si manifestano e i bruchi non si nutrono più.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità dei prodotti previsti, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** XenTari® é miscibile con i nostri fungicidi.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione
Classificazione	Attenzione  Non respirare i aerosoli. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con la pelle. P 102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

	Può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H319 Provoca grave irritazione oculare. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	0.5 kg.
®	Marchio registrato Valent BioSciences Co.
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Version 29.02.24/RH/RF/LG1014

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch