Zeppelin

Herbizid

Unkrautbekämpfungsmittel gegen Unkräuter und Unkrauthirsen in Zucker- und Futterrüben und in Winterraps im Vor- und Nachauflaufverfahren (Herbst)

Produkt	Zeppelin ist ein Suspoemulsion (SE) und enthält 29.5 % (333 g/l) Dimethenamid-P, 14.78 % (167 g/l) Quinmerac. (W-7320-3)
Anwendungsbereich	Feldbau (F).
Wirkungsspektrum	*(**Raps**) gut bekämpfbar:* Klettenlabkraut, Hirtentäschel*, Taubnessel-Arten, Kamille-Arten, Klatsch-Mohn*, Gänsedistel-Arten (aus Samen), Ehrenpreis-Arten, Storchschnabel-Arten, Besenrauke* (*Vorauflauf bis Auflaufen). *weniger gut bekämpfbar:* Vogel-Sternmiere, Acker-Vergissmeinnicht, Acker-Hundskamille. nicht ausreichend bekämpfbar: Ausfallgetreide. Gegen Wurzelunkräuter ist Zeppelin unwirksam. *(**Rüben**) gut bekämpfbar:* Hühnerhirse, Acker-Vergissmeinnicht, Ehrenpreis-Arten, Gemeine Hundspetersilie, Kletten-Labkraut, Taubnessel-Arten. *weniger gut bekämpfbar:* Einjähriges Rispengras, Grosse Knorpelmöhre, Vogel-Sternmiere. *nicht ausreichend bekämpfbar:* Acker-Hellerkraut, Einjähriges Bingelkraut, Acker-Senf, Gemeiner Erdrauch, Rauhhaariger-Amarant, Gemeine Melde, Acker-Stiefmütterchen, Gemeines Hirtentäschel, Ausfall-Raps, Gemeines Kreuzkraut, Knöterich-Arten, Kamille-Arten, Klatschmohn, Weisser Gänsefuss, Distel-Arten, Quecken, Winden.
Anwendung Feldbau	**Futter- und Zuckerrüben:** 1.5 lt/ha, gegen *Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser).* Anwendung: Nachauflauf, Stadium 10-18 (BBCH). Splitbehandlung (angegebene Aufwandmenge entspricht total bewilligter Menge). Behandlungen im Abstand von mindestens 5 Tagen. Maximal 3 Splitbehandlungen gemäss Angaben der Bewilligungsinhaberin. Zum Schutz von Grundwasser Anwendung Quinmerac-haltiger Produkte nur alle 2 Jahre auf

	derselben Parzelle. Herbstanwendung nur alle 4 Jahre. Maximal 250 g Quinmerac/ ha. **Raps:** 1.5 lt/ha, gegen *Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter)*. Anwendung: Vor- oder Nachauflauf. Stadium 00-18 (BBCH). Maximal 1 Anwendung. Zum Schutz von Grundwasser Anwendung Quinmerac-haltiger Produkte nur alle 2 Jahre auf derselben Parzelle. Herbstanwendung nur alle 4 Jahre. Maximal 250 g Quinmerac/ ha. Behandlung von im Herbst gesäten Kulturen.
Wirkungsweise	Zeppelin ist ein Herbizid zur Bekämpfung von Unkräutern in Raps sowie zur Bekämpfung von Unkräutern, einschließlich Klettenlabkraut und Hundspetersilie sowie Unkrauthirsen in Zucker- und Futterrüben. Es wird über Wurzeln, Hypokotyl, Keimblätter und Laubblätter aufgenommen. Deshalb erfasst Zeppelin aufgelaufene, im Auflaufen befindliche und noch nicht aufgelaufene Unkräuter und Unkrauthirsen gleichermassen. Ein guter Bekämpfungserfolg wird dann erzielt, wenn sich der Wirkstoff bei ausreichender Feuchtigkeit im Boden lösen und verteilen kann und somit eine Wirkstoff-aufnahme zusätzlich über das Wurzelsystem der Unkräuter möglich ist. Bereits aufgelaufene Unkräuter werden besonders gut im Keimblatt- bis max. 1. Laubblattstadium erfasst. Klettenlabkraut wird auch bei späteren Anwendungs-terminen noch gut bekämpft.
Herstellung Spritzbrühe	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die abgemessene Menge **Produkt** beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen. **Mischbarkeit:** Zeppelin kann mit anderen Herbiziden gemäss Leu+Gygax-Ratgeber gemischt werden. **Anwenderschutz:** Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzbrille oder Visier tragen. Ausbringen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe + Schutzanzug + Visier + Kopfbedeckung tragen. Technische Schutzvorrichtungen während des Ausbringens (z.B. geschlossene Traktorkabine) können die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ersetzen, wenn gewährleistet ist, dass sie einen vergleichbaren oder höheren Schutz bieten.
Nachbau	Nach einer normalen Kulturdauer können alle Kulturen angebaut werden.
Einstufung	Achtung 

	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. EUH 401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. SPe 2 Zum Schutz von Grundwasser nicht in Grundwasserschutzzonen (S2 und Sh) ausbringen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLV bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Label-programme sind zu beachten.
Verpackung	5 lt.
®	
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 21.02.25/RH/LG0000

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch