Zeppelin

Erbicida

Erbicida contro le malerbe dicotiledoni e monocotiledoni nelle barbabietole da zucchero, da foraggio e nella colza invernale in pre- e postemergenza (autunno).

Prodotto	Zeppelin è una sospensione-emulsione (SE) e contiene 29.5 % (333 g/l) Dimethenamid-P, 14.78 % (167 g/l) Quinmerac. (W-7320-3)
Colture	Campicoltura
Spettro di efficacia	(***Barbabietole da zucchero e da foraggio***) *Buona efficacità contro le malerbe seguenti:* giavone, miosotide dei campi, specie di veronica, cicuta aglina, aparine, specie di ortica purpurea. *Un'efficacia media contro le malerbe seguenti:* poa annua, centonchio. *Un'efficacia insufficiente contro le malerbe seguenti:* erba storna, mercurella, senape, fumaria, amaranto, atreplice comune, borsa pastore, ricacci di colza, senecio volgare, bistorta, specie di camomilla, papavero, chenopodio bianco. ***(Colza)*** *Facili da combattere:* aparine, borsa pastore, specie di ortica purpurea, specie di camomilla, papavero*, specie di crespigno dei campi (a partire dalla semina), specie di veronica, specie di geranio, * (da pre-emergenza alla levata). *Meno facili da combattere:* centonchio, miosotide dei campi, camomilla selvatica. *Non sufficentemente combattute:* ricacci di cereali, Zeppelin non è efficace contro le malerbe con radice a fittone nella colza.
Applicazione Campicoltura	**Barbabietole da foraggio e da zucchero:** 1.5 lt/ha, contro *Dicotiledoni e monocotiledoni annuali.* Applicazione: in post-emergenza, stadi 10-18 (BBCH). Trattamento frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato). Trattamenti a intervalli di almeno 5 giorni. Al massimo 3 trattamenti frazionati come indicato dal titolare dell'autorizzazione. Per proteggere le acque sotterranee

	applicare prodotti contenenti Quinmerac al massimo ogni 2 anni sulla stessa particella. Applicazioni in autunno al massimo ogni 4 anni. Al massimo 250 g Quinmerac/ ha. **Colza:** 1.5 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali.* Applicazione: in pre-emergenza o in post-emergenza. Stadi 00-18 (BBCH). Al massimo un'applicazione. Per proteggere le acque sotterranee applicare prodotti contenenti Quinmerac al massimo ogni 2 anni sulla stessa particella. Applicazioni in autunno al massimo ogni 4 anni. Al massimo 250 g Quinmerac/ ha. Trattamento in colture seminate in autunno.
Modalità di azione	Zeppelin è un erbicida per combattere le malerbe, compreso l'attaccamani e la cicuta aglina come pure il falso panico nelle barbabietole da zucchero e foraggio, e le avventizie nella colza. Esso è assorbito dalle radici, dall'ipocotile, dalle foglie embrionali e dal fogliame. Il prodotto agisce di conseguenza molto bene sulle malerbe già germinate come pure su quelle in corso di levata e quelle non ancora germinate. Se l'umidità è sufficiente, un buon risultato è allora ottenuto, quando pure la sostanza attiva può disciogliersi e ripartirsi nel terreno, rendendo così possibile un assorbimento supplementare della materia attiva tramite il sistema radicale delle malerbe. In caso di trattamento su terreno secco prima della germinazione delle malerbe, l'azione principale, interviene solamente dopo le precipitazioni. Fino a quanto descritto si verifica, le malerbe germinanti dal profondo del terreno, saranno combattute, solo se non hanno ancora raggiunto uno stadio di crescita troppo avanzato. Il prodotto, è particolarmente efficace tra lo stadio cotiledoni e quello della prima foglia al massimo. L'attaccamani continua a essere ben contenuto anche con delle ulteriori applicazioni.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderata, riempire infine il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** in caso di utilizzo in combinazione con altri prodotti, seguire sempre le istruzioni riportate sull'etichetta dei prodotti partner. **Protezione dell'utente:** durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Scheda Tecnica

Rotazione delle colture	Dopo un normale periodo di coltivazione, tutte le colture possono essere coltivate.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. SPe 2 SPe 2Onde proteggere le acque sotterranee evitare i trattamenti nelle zone di protezione delle acque sotterranee (S2 e Sh).
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	5 lt
®	
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le indicazioni di conseguenza.

Version 21.02.25/RH/RF/LG0000

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch