Zwei, 4-D Dicopur®

Erbicida

Erbicida ormonale per combattere le dicotiledoni e le malerbe perenni in campicoltura, frutticoltura e in Superfici non coltivate.

Prodotto	Zwei, 4-D Dicopur® è un concentrato solubile in acqua (SL) e contiene 42.5% (496 g/l) de 2,4 D. (W- 2594)
Colture	Frutticoltura, Campicoltura, Superfici non coltivate.
Spettro di efficacia	Amaranto, Borsa pastore comune, Caglio, attaccaveste, Canapetta comune, Centonchio comune, Cicuta aglina, Crespino dei campi, Erba morella, Erba storna comune, Falsa ortica, Farinello comune, Fiordaliso, Fumaria, Galinsoga, Mercorella, Nontiscordardime, Papavero, Portulaca, Ravanello selvatico, Ricacci di colza, Ricacci di girasole, Senape dei campi, Veronica, Senecione comune, Cardo campestre, Convolvolo, Ranuncolo dei campi, Romice da seme.
Applicazione **Frutticoltura**	**Frutta a granelli, Frutta a nocciolo:** 1.5 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe).* Applicare solo nei giorni con temperature diurne tra 10 e 20°C e temperature notturne superiori a 5°C. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
Campicoltura	**Cereali:** 1.5 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe).* Applicazione: Primavera. Stadi 13 - 29 (BBCH). Applicare solo nei giorni con temperature diurne tra 10 e 20°C e temperature notturne superiori a 5°C. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di

	omologazione. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Mais:** 1.25-1.5 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)*. Applicazione: Primavera. Stadi 13 (BBCH). Applicare solo nei giorni con temperature diurne tra 10 e 20°C e temperature notturne superiori a 5°C. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Prati e pascoli:** 0.15ml/m², contro *Senecioni tossici (Senecio spp.), Veratro comune*. Trattamento pianta per pianta. La dose si riferisce alla superficie effettiva da trattare. Applicare solo nei giorni con temperature diurne tra 10 e 20°C e temperature notturne superiori a 5°C. Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il termine di attesa è di 2 settimane. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
Superfici non coltivate	**Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim):** 0.15ml/m², contro *Senecioni tossici (Senecio spp.)*. La dose si riferisce alla superficie effettiva da trattare. Applicare solo nei giorni con temperature diurne tra 10 e 20°C e temperature notturne superiori a 5°C. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Conformemente all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, allegato 2.5), soltanto trattamenti

	pianta per pianta su piante problematiche su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari, sempre che non possono essere combattute con altre misure.
Modalità di azione	Il Zwei, 4-D Dicopur® fa parte del gruppo delle materie attive ormonali (auxine). Esso viene assorbito dalle foglie e colpisce la turgidezza cellulare. L'efficacia del trattamento come pure la velocità d'azione, vengono migliorate quando le malerbe sono vigorose e in crescita.
Preparazione della poltiglia	Riempire a metà il serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, quindi riempire il serbatoio completamente con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Zwei, 4-D Dicopur® è mescolabile secondo consiglio della ditta LG. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
Rotazione delle colture	---
Classificazione	Pericolo  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 208 Contiene [2,4-D-Dimethylammonium]. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H302 Nocivo se ingerito. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	1 lt. 10 lt
®	Marca depositata da Nufarm, AUS.

Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni.

Version 30.03.22/RH/RF/LG0000

Leu+Gygax AG

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Telefono 031 839 24 41
www.leugygax.ch